

ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาสใหญ่

BIODIVERSITY OF LICHENS AT KHAO YAI NATIONAL PARK IN THAILAND**D**

Compiled by

หน่วยวิจัยไลเคน
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

2547 / 2004



การเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆ บนพื้นฐานของการวิจัยด้านอนุกรมวิธานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรชีวภาพมากมาย รวมทั้งไลเคน (lichen) ที่มีคุณสมบัติกันแดดไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไป คือเกิดจากรวมและสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันในสภาพจำเพาะ และมีศักยภาพในการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก เช่น เป็นส่วนผสมของสบู่นิโพร เป็นยา อาหาร เครื่องสำอาง และสีอื่น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการสำรวจและศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้ขาดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับไลเคน และไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนโครงการสำรวจความหลากหลายชนิดของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของประเทศไทยที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย โดยคำนึงการสำรวจและศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์ วิจัย และการใช้ประโยชน์ไลเคนต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สำนักงานฯ จึงได้จัดทำหนังสือสารเรื่อง ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Biodiversity of Lichens at Khao Yai National Park in Thailand) โดยแสดงรายละเอียดของฐานข้อมูลสายพันธุ์และลักษณะการแพร่กระจายของไลเคน เพื่อให้นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเปรียบเทียบกับไลเคนในพื้นที่อื่นของประเทศไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ ผศ. ดร. กัมปารีย์ บุญประกอบ และคณะวิจัยของหน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ดำเนินการศึกษาวิจัย และมีส่วนสำคัญให้การจัดทำเอกสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วง อันเป็นการเสริมสร้างงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

(นางนิศากร इनิดริลด์)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำโดย : ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2279-7186-9, 0-2271-4232 ต่อ 186, 286
โทรสาร : 0-2271-3226

พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม 2547

ISBN : 974-9632-26-5

การอ้างอิง : หน่วยวิจัยไลเคน สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. ความหลากหลายชนิด
ของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาน้อย, สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
กรุงเทพฯ, 114 หน้า

ผู้เขียน : หน่วยวิจัยไลเคน สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

First published : October 2004
by Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning (ONEP), Thailand.

This publication is financially supported by ONEP and may be
reproduced in whole or in part and in any form for educational
or non-profit purposes without special permission from ONEP,
providing that acknowledgment of the source is made.

No use of this publication may be made for resale or for any
other commercial purposes.

Available from : Biological Resources Section,
Office of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning
60/1 Soi Phibul Wattana 7, Rama VI Road,
Bangkok 10400 THAILAND
Telephone (66) 2279-7186-9, 2271-4232 ext. 186, 286
Facsimile (66) 2271-3226

Citation : Lichen Research Unit, Department of Biology,
Faculty of Science, Ramkhamhaeng University,
2004. *Biodiversity of Lichens at Khao Yai
National Park in Thailand*. Office of Natural
Resources and Environmental Policy and
Planning, Bangkok, Thailand. 114 p.

Author : Lichen Research Unit, Department of Biology,
Faculty of Science, Ramkhamhaeng University

Designed & Printed : Integrated Promotion Technology Co.,Ltd.
Telephone (66) 2585-2076, 2586-0837

การศึกษาวิชัยไลเคนครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมมือและให้กำลังใจจากสถาบัน หน่วยงาน และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบในที่นี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันให้มีแผนการศึกษาวิชัยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงไลเคน ทำให้การวิจัยนี้เกิดขึ้นได้ ขอขอบคุณกรมป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปัจจุบัน) ที่อนุญาตให้สำรวจและใช้ที่พักที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอขอบคุณศาสตราจารย์ประจำ ริงสวอร์ค แสงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยและเก็บรักษาสายพันธุ์ไลเคน

ผู้วิจัยระลึกถึงด้วยความขอบคุณในความช่วยเหลือ สนับสนุนทางวิชาการในด้านอนุกรมวิธานและด้านอื่นๆ ที่ได้รับจาก Professor Trevor Ahl, Dr. Bettina Staiger, Dr. Brian Coppins, Professor John Elix, Professor David Hawksworth, Professor Werner Hempel, Professor Klaus Kalb, Professor Ming-Jou Lai, Dr. Robert Lucking, Dr. Uta Matthes, Dr. Patrik McCarthy, Dr. Mark Patterson, Professor Philip Rundel และ Professor Anthony Whalley

หน่วยวิชัยไลเคน
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายงานนี้เป็นการสรุปสถานภาพของไลเคน จากการสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อตอบคำถามพื้นฐานของทรัพยากรชีวภาพเหล่านี้ว่า เรามีอะไร (What we have ?) มีมากน้อยแค่ไหน (How much we have ?) และมีที่ไหนบ้าง (Where they are ?) ซึ่งจะนำไปสู่มาตรการในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรชีวภาพนี้ต่อไป

ไลเคนสร้างสารธรรมชาติ (natural product) ที่แตกต่างจากพืชอื่นๆ และมีศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก แต่ไลเคนเป็นทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ได้รับการสำรวจและศึกษาอย่างจริงจังในประเทศไทย ในอดีตมีเพียงนักพฤกษศาสตร์จากต่างประเทศมาเก็บสายพันธุ์ไลเคนเป็นครั้งคราวเท่านั้น องค์ความรู้เกี่ยวกับไลเคนในประเทศไทยจึงอยู่ในต่างประเทศ

การสำรวจและศึกษาไลเคนในครั้งนี้ได้องค์ความรู้ต่างๆ มาก เกี่ยวกับไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาไลเคนในประเทศไทยต่อไป เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย เป็นตัวแทนของระบบนิเวศที่พบในประเทศไทยได้ดี ผู้วิจัยได้รวบรวมและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำพิพิธภัณฑ์ไลเคน (Lichen herbarium) ห้องสมุดไลเคน (Lichen library) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ สำหรับการศึกษาวิจัยไลเคนของผู้ที่สนใจ และได้จัดทำ web site เพื่อสืบค้นข้อมูลบางส่วนได้ที่ www.ru.ac.th/lichen

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลเคนที่พบในประเทศไทย ซึ่งยังมีไลเคนอีกมากที่รอการสำรวจและศึกษา

ผศ.ดร. กัมปารีย์ บุญประกอบ
หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้เรียบเรียง

ความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ผศ.ดร. กัญชาวิทย์ บุญประกอบ (*Asst. Prof. Dr. Kansri Boonpragob*)

หัวหน้าโครงการและผู้เขียนเรื่อง

นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา (*Ecology and Physiology*)

E-mail: kansri@ram1.ru.ac.th และ bkansri@hotmail.com

รศ. พิบูลย์ มงคลสุข (*Assoc. Prof. Piboon Mongkolsuk*)

วงศ์ *Physciaceae*

Mycology and Plant Pathology

E-mail: -

ผศ.ดร. นัตสุรางค์ หอมจันทร์ (*Asst. Prof. Dr. Natsurang Homchantara*)

วงศ์ *Thelotremataceae*, *Cladoniaceae* และที่ปรึกษาด้านเทคนิคทางอนุกรมวิธาน

Lichen Taxonomy และ *Phytochemistry*

E-mail: natsurang@ram1.ru.ac.th

อาจารย์เอก แสงวิชิต (*Mr. Ek Sangvichien*)

การแยกออกจากไลเคน

Microbial Physiology

E-mail: eks@ram1.ru.ac.th

รศ. ชุตินา ศรีวิบูลย์ (*Assoc. Prof. Chutima Sriviboon*)

วิเคราะห์ไอโซโทปหนักในไลเคน

Analytical Chemistry (เคมีวิเคราะห์)

E-mail: chutima@ram1.ru.ac.th

อาจารย์จรงค์ศักดิ์ วงศ์ชีวิรัตน์ (*Mr. Jongsak Fongshewarat*)

วงศ์ *Trypetheliaceae*

Lichen Taxonomy

E-mail: kvongshewarat@hotmail.com

นางสาวกนิษฐา น้อยเจริญ (*Ms. Kawinnat Noicharoen*)

Macrolichens : วงศ์ *Coccocarpiaceae*, *Collemataceae*, *Lobariaceae*, *Pannariaceae*, *Parmeliaceae*, *Ramalinaceae*, *Usneaceae*

Lichen Taxonomy

E-mail: n_kawinnat@hotmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิตธุระการ (*Ms. Jutarat Sujarithrakarn*)

วงศ์ *Graphidaceae*

Lichen Taxonomy

E-mail: sea_flora@hotmail.com

นายนิมิตร โอธานนท์ (Mr. Nimitr Osathanont)

คู่มือการเพาะพันธุ์และการเก็บตัวของไลเคน

Lichen Ecology

E-mail: osathanont@yahoo.com

นายเวชศาสตร์ พอลเยี่ยม (Mr. Wechasant Polriam)

ไลเคนบนเรือนยอด (Canopy Lichens)

Lichen Ecology and Taxonomy

E-mail: wechasant@hotmail.com

นางสาวขวัญเรือน พาป็อง (Ms. Khwanruan Papong)

ไลเคนบนใบไม้ (Follicolous lichens)

Lichen Taxonomy

E-mail: khwanruen@hotmail.com

นางสาวชนนิกานต์ คัมพะกุล (Ms. Chounikan Thunyagun)

Disc lichens : 34 สกุล: Bacidiaceae, Fuscideaceae, Gyalectaceae,

Haematommataceae, Hymeneliaceae, Lecanoraceae, Letrouitiaceae,

Megalosporaceae, Pilocarpaceae และ Trapeliaceae

Lichen Taxonomy

E-mail: chounikan_t@hotmail.com

นายสุชาธร มาสจันทึก (Mr. Suthachon Masathit)

วิเคราะห์ไอโซโทปหนักในไลเคน

Analytical Chemistry

นางสาวมานามาส สุทธาชีพ (Ms. Makamas Suthacheep)

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป

E-mail: smakamas@hotmail.com

นางสาวฤดี น้อยเจริญ (Ms. Ruadee Noicharoen)

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมศรี อุคนไพศาล (Ms. Somsiri Udompalsarn)

ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป

E-mail: U_somsiri@hotmail.com

หน่วยวิจัยไลเคน

ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 0-2310-8395, 0-2310-8416

โทรสาร 0-2310-8395, 0-2310-8416,

0-2310-8381

Lichen Research Unit

Department of Biology

Faculty of Science

Ramkhamhaeng University

Bangkok 10240

Telephone (66) 2310-8395, 2310-8416

Facsimile (66) 2310-8395, 2310-8416,

2310-8381

E-mail: lichen@ram1.ru.ac.th

Homepage: www.ru.ac.th/lichen

บทนำ	9
ผอัครจากโครงการวิจัย	10
ความหลากหลายชนิดของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	11
การเก็บตัวอย่างไลเคนและจำแนกตามหลักอนุกรมวิธาน	12
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	14
ความหลากหลายชนิดของไลเคนระบบนิเวศต่างๆ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	21
การศึกษาภูมิอากาศเฉพาะแห่งที่ไลเคนเติบโต	33
การเติบโตของไลเคน	35
ไลเคนหลักในไลเคน	38
การแยกสายพันธุ์ไว้ในไลเคน	39
การเก็บรักษาสายพันธุ์ไลเคนในพิพิธภัณฑ์และองค์ประกอบพิพิธภัณฑ์ไลเคน ในระบบสากล	40
การบันทึกและทำฐานข้อมูลไลเคน	41
การสร้าง web site ของไลเคน	42
อนาคตของไลเคน	43
การจำแนกไลเคน	45
มหไลเคน (macrolichens) พวงโฟลีโอส (foliose) พรุติโกส (fruticose) และ สเกลมูโลส (squamulose) และจุลไลเคน (microlichens) พวงครัสโตส (crustose)	46
คู่มือจำแนกวงศ์ของไลเคนพวงพรุติโกส โฟลีโอส สเกลมูโลส และครัสโตส (key to families of fruticose, foliose, squamulose and crustose lichens)	48
ไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens)	53
บรรณานุกรม	61
ภาคผนวก	67
ภาคผนวก ก บัญชีรายชื่อ ไลเคนที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (พ.ศ. 2542-2544)	68
ภาคผนวก ข เปรียบเทียบจำนวนสกุล (genus) และชนิด (species) ของไลเคนที่พบ ในโลก พบในประเทศไทยในอดีต และพบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปัจจุบัน	109
ภาคผนวก ค จำนวนสกุล (genus) และชนิด (species) ของไลเคนที่พบในระบบ นิเวศต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยแสดงถึงจำนวนชนิด ที่เป็นการพบครั้งแรก (new records) และชนิดใหม่ (new species)	113



Pyxine sp.



Relicina sp.



Pyrrhospora sp.



Heterodermia sp.



Usnea sp.

ไลเคนสร้างสารธรรมชาติ (natural products) หรือที่เรียกว่าสารไลเคน (lichen product) แตกต่างจากที่พบในสิ่งมีชีวิตอื่น เนื่องจากธรรมชาติของการเกิดไลเคนไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไป คือไลเคนเกิดจากราและสาหร่ายที่อยู่ร่วมกันในสภาวะที่จำเพาะ ในปัจจุบันพบสารไลเคนประมาณ 700 ชนิด มีศักยภาพในการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก คนพื้นเมืองทุกเชื้อชาติตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณรู้จักนำไลเคนมาใช้ประโยชน์ต่างกัน เช่น เป็นส่วนผสมของสมุนไพร เป็นยา อาหาร เครื่องดื่ม และสีย้อม ส่วนในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมหลายชนิดที่ใช้สารจากไลเคนเป็นส่วนประกอบรวมทั้งใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพอากาศได้ด้วย

ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรชีวภาพ (biological resources) รวมทั้งไลเคนแต่ขาดความรู้ และข้อมูลของทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ศึกษา บันทึก และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งมีระบบนิเวศที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์ และศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ไลเคนอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต



Parmotrema sp.



Phaeographina reticulata



Coccocarpia sp.



Coenogonium sp.

ผลลัพธ์จากโครงการวิจัย ประกอบด้วย

- ตัวอย่างไลเคนประมาณ 6,400 ตัวอย่าง ที่ได้ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ อย่างลึกซึ้งตามหลักอนุกรมวิธาน ตัวอย่างเหล่านี้เก็บรักษาอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำหรับใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาเปรียบเทียบ
- สายพันธุ์บริสุทธิ์ของราที่แยกจากไลเคน จำนวน 60 สายพันธุ์ เก็บรักษาอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการศึกษาไลเคนในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยหลักและวิธีการ (keys) ในการจำแนกไลเคนตามหลักอนุกรมวิธานรวม 518 ชนิด แต่ละชนิดมีภาพคำบรรยาย (description) และรายละเอียดของลักษณะประจำชนิด
- ฐานข้อมูลสายพันธุ์และการแพร่กระจายไลเคน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- web site การศึกษาวิจัยไลเคน อยู่ใน home page ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชื่อ www.ru.ac.th/lichen



ความหลากหลายชนิดของไลเคน
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การเก็บตัวอย่างไลเคนและจำแนก ตามหลักอนุกรมวิธาน



✱ การเก็บตัวอย่างไลเคน

กระทำในระบบนิเวศ 7 แห่งคือ ป่าดิบชื้น (tropical rain forest, TRF) ป่าดิบแห้ง (dry evergreen forest, DEF) ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest, DDF) ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest, MDF) ป่าดิบเขา (lower montane forest, LMF) ป่ารุ่นสอง (secondary forest, SF) และพรรณไม้ปลูก (plantation, P) ที่ระดับน้ำทะเล 200–1,200 เมตร โดยเก็บจากที่อยู่อาศัยของไลเคน ได้แก่ บนต้นไม้ หิน ดิน และเก็บจากที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่เคยสำรวจมาก่อน เช่น บนเรือนยอด (canopy) ของพรรณไม้ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินมากและเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีของไลเคน แต่โดยทั่วไปแล้ว ไลเคนส่วนนี้เข้าถึงได้ยาก นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างและศึกษาไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens) ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อนอย่างจริงจังในประเทศไทย ได้ตัวอย่างรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,400 ตัวอย่าง

✱ การจัดจำแนกไลเคนตามหลักอนุกรมวิธาน

การจำแนกชนิด (species) ของไลเคนไม่สามารถกระทำได้โดยการสังเกตลักษณะภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องศึกษาโครงสร้างภายนอก (morphology) ลักษณะทางกายวิภาค (anatomy) และส่วนประกอบทางเคมี หรือสารธรรมชาติ (natural products) ที่ไลเคนสร้างประกอบกัน

✧ รูปลักษณะภายนอกของไลเคน

อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

จุลไลเคน (microlichens)

เป็นไลเคนขนาดเล็กได้แก่ ไลเคนพวกครัสโตส (crustose) ซึ่งมีลักษณะคล้ายฝุ่นผง (ภาพที่ 1 ก)

มหไลเคน (macrolichens)

เป็นไลเคนขนาดใหญ่ได้แก่ ไลเคนพวกฟอลิโอส (foliose) ซึ่งมีลักษณะคล้ายแผ่นใบ (ภาพที่ 1 ข) และไลเคนพวกฟรุติโคส (fruticose) มีลักษณะเป็นพุ่มหรือเส้นสาย (ภาพที่ 1 ค)

ก ▼



ข ▼



ค ▶



ภาพที่ 1 รูปร่างไลเคนที่พบทั่วไปคือ จุลไลเคน (microlichens) ได้แก่ ก) ไลเคนพวกครัสโตส (crustose) เช่น *Buellia* sp. และ มหไลเคน (macrolichens) ได้แก่ ข) ไลเคนพวกฟอลิโอส (foliose) เช่น *Parmotrema* sp. และ ค) ฟรุติโคส (fruticose) เช่น *Usnea* sp.



ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

สายพันธุ์ไลเคนที่พบในประเทศไทยในอดีตร (พ.ศ. 2452-2541) โดยการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่มีประมาณ 780 ชนิด ตัวอย่างเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ขัณฑ์ต่างประเทศ เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สามารถจำแนกไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ 518 ชนิด (species) 90 สกุล (genus) 32 วงศ์ (family) ดังภาคผนวก ก รายชื่อไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พ.ศ. 2542-2544 (Checklist of Lichens at Khao Yai National Park, 1999-2001) ที่แนบท้ายรายงานนี้ พบมากที่สุดในปีคืบขึ้น 298 ชนิด รองลงมาได้แก่ป่าดิบแล้ง 224 ชนิด ป่าดิบเขา 215 ชนิด ป่ารุ่นสอง 184 ชนิด ป่าเบญจพรรณ 80 ชนิด พรวณไม้ปลูก 67 ชนิด และป่าเต็งรัง 60 ชนิด (ภาคผนวก ค) ไลเคนเหล่านี้ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรก (new records) ในประเทศไทย คือไม่เคยมีรายงานการพบมาก่อน 236 ชนิด (species) โดยคิดเป็นร้อยละ 45 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ (ภาพที่ 2 ตารางที่ 1 และภาคผนวก ข)

ส่วนไลเคนที่คาดว่าเป็นพันธุ์ใหม่ (new species) เนื่องจากมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับที่เคยมีรายงานมาก่อน พบประมาณ 129 ชนิด หรือร้อยละ 25 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดในครั้งนี้ ดังแสดงในภาพที่ 2 ตารางที่ 1 โดยรายละเอียดของแต่ละวงศ์แสดงในภาคผนวก ข ไลเคนชนิดใหม่ (new species) ประกอบด้วยมหไลเคนหรือไลเคนขนาดใหญ่ (macrolichens) พวกโพลีโอสและฟรุติโกส 18 ชนิด และจุลไลเคนหรือไลเคนขนาดเล็ก (microlichens) พวกครัสโตส 103 ชนิด และไลเคนบนใบไม้ (foliicolous) 8 ชนิด ตารางที่ 2 และภาคผนวก ข ระบบนิเวศที่พบไลเคนชนิดใหม่มากที่สุดคือ ป่าดิบขึ้น ซึ่งพบถึง 58 ชนิดและรองลงมาคือป่าดิบเขาพบ 44 ชนิด ป่ารุ่นสองและป่าดิบแล้งพบ 34 และ 30 ชนิด ตามลำดับ โดยพบในป่าเต็งรัง 12 ชนิด ส่วนป่าเบญจพรรณและพรวณไม้ปลูกพบเท่ากันป่าละ




Graphina fissosporata



ascomata of *Graphina fissosporata* x-section

9 ชนิด (ภาคผนวก ก) ตัวอย่างไลเคนชนิดใหม่ที่ไม่สามารถกำหนดชื่อได้เหล่านี้ ผู้วิจัยได้บรรยายลักษณะถ่ายภาพและวาดภาพลายเส้นเน้นส่วนประกอบที่สำคัญ แล้วตั้งชื่อชนิดชั่วคราวไว้ เช่น sp. 1, sp. 2 เป็นต้น เพื่อรอการตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ โดยตัวอย่างบางส่วนได้พิมพ์เผยแพร่เพื่อประกาศเป็น พันธุ์ใหม่ (new species) แล้ว 10 ชนิด (species) และอยู่ระหว่างรอการพิมพ์เผยแพร่ อีก 2 ชนิด มีตัวอย่างที่รอการตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อประกาศ เป็นชนิดใหม่ (new species) ของโลกอีกประมาณ 117 ชนิด




ภาพที่ 2 สัดส่วนของชนิดไลเคนที่เก่าย (old records) พบครั้งแรก (new records) ในประเทศไทย และชนิดใหม่ (new species) ของโลก ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนชนิด (species) ของไลเคนที่พบทั้งหมด พบครั้งแรก (new records) และชนิดใหม่ (new species) ในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2544 โดยจำแนกตามกลุ่มหลักของไลเคนและเปรียบเทียบ กับจำนวนสายพันธุ์ที่พบในอดีตในประเทศไทยและที่พบในโลก

ไลเคน (Lichens)	พบในโลก	พบในไทย (อดีต) (พ.ศ. 2525-2541)	พบที่เขาค้อใหญ่ (ปัจจุบัน) (พ.ศ. 2542-2544)		
			ทั้งหมด	ครั้งแรก	ชนิดใหม่
รวมทั้งสิน' (32 วงศ์)	10,086	659	518	236	129
รวม มหไลเคนและจุลไลเคน	9,429	631	414	161	121
มหไลเคน 9 วงศ์	5,137	348	164	61	18
จุลไลเคน 18 วงศ์	4,292	283	250	100	103
ไลเคนบนใบไม้ 15 วงศ์	657	28	104	75	8

¹ มีไลเคน 1 วงศ์ที่เป็นทั้งมหไลเคนและจุลไลเคน
มีไลเคนบนใบไม้ 9 วงศ์ ที่พบเช่นเดียวกับที่พบในมหไลเคนและจุลไลเคน

ไลเคนที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งหมดประกอบด้วยมหไลเคน (macrolichens) พวกโฟลิโอส (foliose) และฟูทิกโคส (fruticose) 164 ชนิด จุลไลเคน (microlichens) พวกครัสโตส (crustose) 258 ชนิด และไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens) 104 ชนิด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32, 48 และ 20 ตามลำดับ (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 3 สัดส่วนของมหไลเคน (macrolichens) พวกโฟลิโอส (foliose) และฟูทิกโคส (fruticose) จุลไลเคน (microlichens) พวกครัสโตส (crustose) และไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสถานภาพ ดังนี้

✱ มหไลเคนหรือไลเคนขนาดใหญ่ (macrolichens)

มหไลเคนที่เห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าประกอบด้วย ไลเคนพวกแผ่นใบ (foliose) และเส้นสาข (fruticose) พบ 164 ชนิด (species) 25 สกุล (genus) 9 วงศ์ (family) ในอดีต (พ.ศ. 2452–2541) มีรายงานว่าพบไลเคนกลุ่มนี้ในประเทศไทย 348 ชนิด (ตารางที่ 1 และภาคผนวก ข)

การศึกษาในครั้งนี้ (พ.ศ. 2542–2544) มีมหไลเคนที่พบเป็นครั้งแรก (new records) ในประเทศไทย 61 ชนิด (species) คิดเป็นร้อยละ 37 ของสายพันธุ์ มหไลเคนที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประกอบด้วยสายพันธุ์ใหม่ของโลก (new species) อีกประมาณ 18 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 11 ของสายพันธุ์ มหไลเคน ที่พบในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีสายพันธุ์ที่เคยมีรายงานการพบมาแล้วในประเทศไทย 85 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 49 (ตารางที่ 1 และ 4)

มหไลเคนพบมากที่สุดในป่าดิบชื้นคือพบถึง 92 ชนิด และรองลงมาตามลำดับในป่าดิบเขา 77 ชนิด ป่ารุ่มสอง 75 ชนิด ป่าดิบแล้ง 71 ชนิด พรวนไม้ปลูก 36 ชนิด ป่าเต็งรัง 28 ชนิด และป่าเบญจพรรณ 18 ชนิด (ตารางที่ 4 และภาคผนวก ก)



Bulbothrix sp.

* จุลไลเคนหรือไลเคนขนาดเล็ก (microlichens)

ไลเคนพวกครัสโตส (crustose) ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นผืนหรือซึ่งชาวบ้านอาจเรียกว่ากลากเกลื้อนต้นไม้ พบ 250 ชนิด (species) 42 สกุล (genus) 18 วงศ์ (family) รายงานการพบไลเคนทั้ง 18 วงศ์นี้ในโลกมีประมาณ 4,300 ชนิด ในอดีต (พ.ศ. 2452-2541) มีรายงานการพบในประเทศไทย 283 ชนิด การศึกษาครั้งนี้ (พ.ศ. 2542-2544) พบว่ามีไลเคนที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new record) 100 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 40 ของสายพันธุ์จุลไลเคนที่พบทั้งหมดในเขตอุทยานฯ และประกอบด้วยสายพันธุ์ใหม่ (new species) ประมาณ 103 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 41 ของสายพันธุ์จุลไลเคนที่พบในการศึกษาครั้งนี้ (ตารางที่ 1 และภาคผนวก ข) โดยมีสายพันธุ์ที่เคยมีรายงานการพบมาก่อนเพียง 47 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 19 ของจุลไลเคนในเขตอุทยานฯ (ตารางที่ 4)



Phaeographina jambosae



Phaeographis pruinosa

จุลไลเคนพบมากที่สุดในป่าดิบชื้นคือ พบถึง 144 ชนิด และรองลงมาตามลำดับในป่ารุ่มสอง 102 ชนิด ป่าดิบเขา 96 ชนิด ป่าดิบแล้ง 80 ชนิด ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ พบเท่ากันป่าละ 32 ชนิด และพรวนไม้ปลูก 31 ชนิด (ตารางที่ 4 และภาคผนวก ค)

* ไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens)

ไลเคนบนใบไม้เป็นไลเคนที่เติบโตอยู่บนใบไม้มีขนาดเล็กมาก ในอดีตมีการสำรวจเบื้องต้นเพียงครั้งเดียวในประเทศไทย โดยพบ 28 ชนิด ไลเคนกลุ่มนี้ไม่เคยมีรายงานการศึกษาในประเทศเขตร้อนของทวีปเอเชียมาก่อน มีเพียงรายงานการศึกษาจากทวีปอเมริกาใต้ และอเมริกากลางเท่านั้น

ครั้งนี้เป็นการศึกษาไลเคนบนใบไม้อย่างจริงจังในประเทศไทยโดยทำการเก็บตัวอย่างในทุกระบบนิเวศ ตัวอย่างทั้งหมดมีประมาณ 2,000 ตัวอย่าง จำแนกได้ 104 ชนิด (species) 30 สกุล (genus) ใน 15 วงศ์ (family) มีรายงานการพบไลเคนบนใบไม้ของโลกทั้ง 15 วงศ์นี้จำนวนประมาณ 660 ชนิด (ตารางที่ 1 และภาคผนวก ข)



Byssoloma leucoblepharum

การศึกษานี้พบสาขพันธุ์ที่พบครั้งแรก (new records) ในประเทศไทย 73 ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 72 ของสาขพันธุ์ไลเคนบนใบไม้ที่พบทั้งหมด ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประกอบด้วย สาขพันธุ์ที่อาจเป็นชนิดใหม่ (new species) ของโลก 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 7 ของสาขพันธุ์ไลเคนบน ใบไม้ทั้งหมดที่พบในการศึกษานี้ (ตารางที่ 1) โดยมีสาขพันธุ์ที่เคยมีรายงานการพบมาก่อนเพียง 21 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 20 ของไลเคนบน ใบไม้ในเขตอุทยานฯ

ไลเคนบนใบไม้พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าดิบแล้ง คือพบถึง 73 ชนิด และรองลงมา ตามลำดับในป่าดิบชื้น 62 ชนิด ป่าดิบเขา 42 ชนิด ป่าเบญจพรรณ 30 ชนิด และป่ารุ่มสอง 7 ชนิด โดยไม่พบในป่าเต็งรังและพรรณไม้ปลูก (ตารางที่ 4 และ ภาคผนวก ก)

✱ ไลเคนที่เรือนยอด (canopy lichens)

ไลเคนต้องการแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างหนึ่งในการดำรง ชีวิต เรือนยอดซึ่งสูงถึง 15-30 เมตร ของพรรณไม้ในป่าเมืองร้อน ทำหน้าที่ดูดซับ แสงไว้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริเวณใกล้พื้นดิน มีแสงสัว อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของไลเคนบางชนิด อีกทั้งพบว่าถึงไม้ที่หักตกลงมาจากเรือนยอด มีไลเคนหลากหลายชนิดเติบโตอยู่ และแตกล้างจากไลเคนที่พบในบริเวณแสง สัวใกล้พื้น การศึกษาไลเคนบนเรือนยอดจึงเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านความ หลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การศึกษาไลเคนบนเรือนยอดในครั้งนี้ กระทำโดยการปีนเชือก โดยมี พื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ทำการเก็บตัวอย่าง จากป่าดิบแล้งและป่าดิบเขาบ้าง ส่วนป่าเต็งรัง ซึ่งพรรณไม้หลักไม่สูงมากนัก กระทำโดยการไต่บันไดปีนเก็บตัวอย่าง ทั้งหมดมีประมาณ 720 ตัวอย่าง จำแนก ได้ 129 ชนิด 46 สกุล ใน 25 วงศ์ประกอบด้วย มหาไลเคน (macrolichens) 82 ชนิด



และจุลไลเคน (microlichens) 47 ชนิด ไลเคนที่พบที่ เรือนยอดมีประมาณร้อยละ 25 ของสาขพันธุ์ทั้งหมด ที่พบในเขตอุทยานฯ มหาไลเคน พวงไฟลิโอสและ พูทิลอสที่พบที่เรือนยอดประกอบด้วยสาขพันธุ์ที่พบ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new records) 5 ชนิด และชนิดใหม่ (new species) 8 ชนิด โดย 2 ชนิด ได้รับการยืนยันลักษณะแล้วและอยู่ระหว่างการพิมพ์ เผยแพร่ (จุลไลเคนชนิดใหม่)

* ไลเคนที่พบเป็นครั้งแรก (new records)

การศึกษาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในครั้งนี้ พบสายพันธุ์ไลเคนที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) ถึง 236 ชนิด โดยมีไลเคนในกลุ่มครีโตส (หรือจุลไลเคน) จำนวนมากที่สุดถึง 100 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 40 ของไลเคนพวกพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) ที่พบทั้งหมดในการศึกษานี้ โดยเป็นไลเคนในวงศ์ Graphidaceae ถึง 59 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 4 ของไลเคนพวกพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) รองลงมาได้แก่ ไลเคนในวงศ์ Trypetheliaceae และ Thelotremaaceae มีสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรก 15 และ 8 ชนิด ตามลำดับ หรือประมาณร้อยละ 6 และ 3 ของไลเคนพวกพบเป็นครั้งแรก (ภาคผนวก ข)

ไลเคนบนใบไม้ซึ่ง (ประกอบด้วย 15 วงศ์) มีสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรก ถึง 75 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 32 ของไลเคนพวกพบครั้งแรกในประเทศไทย

กลุ่มมหไลเคน (macrolichens) หรือพวกแผ่นใบ (foliose) และเส้นสาย (fruticose) มีสายพันธุ์ที่พบครั้งแรก (new records) 61 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 29 ของไลเคนพวกพบครั้งแรก โดยประกอบด้วยไลเคนในวงศ์ Physciaceae 23 ชนิด หรือร้อยละ 10 ของไลเคนพวกพบเป็นครั้งแรก นอกจากนี้วงศ์ Parmeliaceae รายงานสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรก 13 ชนิด ประมาณร้อยละ 6 ของไลเคนพวกพบเป็นครั้งแรก (ภาคผนวก ข)

* ไลเคนชนิดใหม่ (new species)

ไลเคนสายพันธุ์ใหม่ของโลก (new species) ซึ่งยังไม่สามารถจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์ได้ พบทั้งหมด 129 ชนิด โดยไลเคนในกลุ่มครีโตส หรือจุลไลเคนมีจำนวนมากที่สุดถึง 10 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 80 ของไลเคนในกลุ่มสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดจากการสำรวจในครั้งนี้ โดยจุลไลเคนวงศ์ Graphidaceae พบสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดถึง 53 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 40 ของสายพันธุ์ใหม่ ที่พบรองลงมาได้แก่ ไลเคนวงศ์ Thelotremaaceae (จุลไลเคน) และวงศ์ Trapeliaceae (จุลไลเคน) ซึ่งพบสายพันธุ์ใหม่วงศ์ละ 11 และ 10 ชนิด ตามลำดับ ส่วนจุลไลเคนวงศ์อื่นๆ เช่น Bacidiaceae, Fuscideaceae และ Lecanoraceae พบไลเคนชนิดใหม่วงศ์ละประมาณ 4-6 ชนิด โดยวงศ์ Hymeneliaceae, Lecideaceae, Letrouitiaceae, Megalosporaceae, Pertusariaceae, Pyrenulaceae และ Trypetheliaceae พบไลเคนชนิดใหม่วงศ์ละ 1-3 ชนิด (ภาคผนวก ข)



Myriotrema grandisporum



Myriotrema thailandicum



Ocellularia kanoriae



Parmotrema euplectinum



Relicina polycarpa

มีการพิมพ์เผยแพร่สายพันธุ์ไลเคนใหม่ จากวงศ์ Thelotremaaceae ที่เก็บจากอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่อีก 10 ชนิด ได้แก่ *Myriotrema grandisporum* Homchantara & Coppins, *M. khaoyaianum* Homchantara & Coppins, *M. subanamlense* Homchantara & Coppins, *M. subminutum* Homchantara & Coppins, *M. thailandicum* Homchantara & Coppins, *Ocellularia kansriae* Homchantara & Coppins, *O. major* Homchantara & Coppins, *O. perimargens* Homchantara & Coppins, *O. wolseleyana* Homchantara & Coppins และ *Thelotrema rhododiscum* Homchantara & Coppins.

มหไลเคนพวกโฟลิโอสและฟูทิลิโอสพบสายพันธุ์ใหม่ 18 ชนิด คิดเป็น ร้อยละ 14 ของไลเคนชนิดใหม่ โดยประกอบด้วยไลเคนวงศ์ Parmeliaceae และวงศ์ Collemaaceae วงศ์ละ 5 ชนิด วงศ์ Physciaceae 4 ชนิด และวงศ์ Usneaceae 2 ชนิด โดยไลเคนวงศ์ Parmeliaceae ผ่านการตรวจสอบแล้วและอยู่พิมพ์เผยแพร่เพิ่มอีก 2 ชนิด ได้แก่ *Parmotrema euplectinum* Elix, Noicharoen & P. Wolseley เก็บจาก ป่าดงรังที่เขาสมอปูน และ *Relicina polycarpa* Elix & Polyiam เก็บจากป่าดิบชื้น ใกล้ลำคลองกอกแก้ว

ไลเคนบนใบไม้พบสายพันธุ์ใหม่ 8 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 6 ของไลเคน ชนิดใหม่ทั้งหมด ไลเคนชนิดใหม่ที่ยังไม่สามารถกำหนดสายพันธุ์อีกประมาณ 117 ชนิด จะทำการตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ เพื่อยืนยันสายพันธุ์ใหม่ ค่อไป ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

ความหลากหลายชนิดของไลเคนระบบนิเวศต่างๆ

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกอบด้วยระบบนิเวศ 7 ชนิด คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่ารุ่มสอง และไม้ปลูก ซึ่งมีภูมิอากาศและส่วนประกอบของพรรณไม้แตกต่างกัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น (tropical rain forest) โดยป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest) มีพื้นที่รองลงมา ส่วนป่าอื่นๆ มีพื้นที่เป็นส่วนน้อย รวมทั้งมีพรรณไม้ปลูกในบริเวณใช้งานของอุทยานฯ เช่น อาคาร ถนน ซึ่งพรรณไม้ปลูกเป็นที่เกาะอาศัยของไลเคนได้ดีด้วย ไลเคนมีการแพร่กระจายในระบบนิเวศต่างๆ ได้ต่างกัน บางชนิดแพร่กระจายได้ในสภาพแวดล้อมหลายแบบ โดยพบได้ในหลายสภาพป่า บางชนิดมีความจำเพาะกับสภาพป่าแบบใดแบบหนึ่ง การแพร่กระจายของไลเคนจำนวน 518 ชนิดที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีดังนี้

✱ ไลเคนที่มีการแพร่กระจายดี

ไลเคนที่พบได้ในทุกสภาพป่า

ไลเคนที่มีการแพร่กระจายดีมาก คือพบได้ในทุกสภาพป่าและพรรณไม้ปลูก (7 ระบบนิเวศ) มี 7 ชนิด ได้แก่ *Graphis dumastiioides*, *G. rimulosa*, *Phaeographina chlorocarpoides*, *P. quassiaecola*, *Parmotrema tinctorum*, *Laurera benguelensis*, *Trypethelium eluteriae*

ไลเคนที่พบได้ในป่า 6 ประเภท

ไลเคนที่มีการแพร่กระจายดี คือ พบการแพร่กระจายในระบบนิเวศ 6 ประเภท มี 8 ชนิด ดังการแพร่กระจายในตารางที่ 2



Parmotrema tinctorum



Graphis rimulosa



Laurera benguelensis

ตารางที่ 2 รายชื่อไลเคนที่มีการแพร่กระจายดี โดยพบในระบบนิเวศ 6 ประเภท ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Scientific	LMF	DDF	DEF	TRF	MDF	SF	P
<i>Coccocarpia palmicola</i>	+	+	+	+	-	+	+
<i>Dirinaria appianata</i>	+	+	+	-	+	+	+
<i>Dirinaria picta</i>	-	+	+	+	+	+	+
<i>Graphis vermifera</i> *	+	-	+	+	+	+	+
<i>Parmotrema sancii-angelii</i>	+	-	+	+	+	+	+
<i>Phaeographina pudica</i> *	+	+	+	+	-	+	+
<i>Pyxine coralligera</i>	-	+	+	+	+	+	+
<i>Trypethelium tropicum</i>	+	+	+	+	+	+	-

* ไลเคนที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records);

- + พบ LMF ป่าดิบเขา (lower montane forest)
- ไม่พบ DDF ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest)
- DEF ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest)
- TRF ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)
- MDF ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
- SF ป่าไผ่สอง (secondary forest)
- P พรรณไม้ปลูก (plantation)



Coccocarpia palmicola



Dirinaria picta



Parmotrema sancii-angelii

ไลเคนที่พบในป่า 5 ประเภท

ไลเคนที่มีการแพร่กระจายดี โดยพบการแพร่กระจายในระบบนิเวศ 5 ประเภท มี 29 ชนิด ดังการแพร่กระจายในตารางที่ 3



Parmotrema garneri



Sarcographa actinobola



Glyphis cicatricosa



Bulbothrix isidiza



Letrouitia vulpina



Relicrinopsis malaicensis

ตารางที่ 3 รายชื่อไลเคนที่มีการแพร่กระจายดี โดยพบในระบบนิเวศ 5 ประเภท ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Scientific	LMF	DDF	DEF	TRF	MDF	SF	P
<i>Bulbothrix isidiza</i>	+	+	+	+	-	+	-
<i>Coccocarpia dissecta</i>	-	+	+	+	+	+	-
<i>Coccocarpia erythraeoli</i>	+	+	+	+	-	+	-
<i>Coccocarpia pellisa</i>	+	+	+	+	-	+	-
<i>Glyphis cicutricose*</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Graphina colliculosa*</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Graphis afzelii</i>	-	-	+	+	+	+	+
<i>Haematomma puniceum</i>	+	+	+	+	-	+	-
<i>Heterodermia appendiculata*</i>	+	+	+	-	-	+	+
<i>Heterodermia obscurata*</i>	+	-	+	-	+	+	+
<i>Lecanora cenisia*</i>	+	+	+	+	-	+	-
<i>Leptogium cyanescens</i>	-	-	+	+	+	+	+
<i>Leptogium marginellum</i>	+	-	+	+	+	+	-
<i>Letrouitia transgressa*</i>	+	-	+	+	+	+	-
<i>Letrouitia vulpine</i>	+	-	+	+	+	+	-
<i>Parmotrema gardneri</i>	-	-	+	+	+	+	+
<i>Parmotrema poolii</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Parmotrema praesorediosum</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Parmotrema rampoddense</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Phaeographina caesiocradians*</i>	-	+	+	+	-	+	+
<i>Phaeographina obfirmata*</i>	-	+	+	+	-	+	+
<i>Pseudopyrenula diluta</i> var. <i>degenerans</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Relicinopsis intertexta</i>	-	+	+	+	-	+	+
<i>Relicinopsis malaccensis</i>	-	+	+	+	+	+	-
<i>Sarcographa actinobola*</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Sarcographa cuyabensis*</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Sarcographina glyphiza*</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Usnea baileyi</i> var. <i>baileyi</i>	+	-	+	+	-	+	+
<i>Usnea undulata</i>	+	-	+	+	-	+	+

- *

ไลเคนที่เป็นรายงานการพบครั้งแรก ในประเทศไทย (new records);
- +

พบ

LMF

ป่าดิบเขา (lower montane forest)
- ไม่พบ

DDF

ป่าดึ่งร้ง (dry dipterocarp forest)
- DEF

ป่าดิบเขียว (dry evergreen forest)
- TRF

ป่าดิบชื้น (tropical rain forest)
- MDF

ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
- SF

ป่ารุ่นทด (secondary forest)
- P

พรรณไม้ปลูก (plantation)



Stricta sp.



Myriotrema thailandicum



Ocellularia arecae



Ocellularia crassa



Relicina palmata



Relicina relacinula



Relicina subconnexa

✱ โลเคนในป่าดิบชื้น (tropical rain forest)

ป่าดิบชื้นเป็นป่าที่ได้รับน้ำฝนมากที่สุดและเป็นที่ป่าส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พรรณไม้สูงเรือนยอดชิดกัน ทำให้พื้นล่างได้รับแสงน้อย จึงพบโลเคนพวกโพลีโอสและฟูทิลโคสเติบโตที่ระดับเรือนยอด ส่วนระดับล่างใกล้พื้นดินพบโลเคนกลุ่มครัสโตสเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจพบโลเคนกลุ่มโพลีโอส ที่มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นส่วนประกอบบ้างเล็กน้อย ป่าประเภทนี้พบความหลากหลายทางชีวภาพของโลเคนมากที่สุดในพื้นที่อุทยานฯ คือพบถึง 298 ชนิด หรือเกือบร้อยละ 60 ของโลเคนที่พบทั้งหมดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วย จุลโลเคน (crustose) 144 ชนิด หรือประมาณกึ่งหนึ่งของสายพันธุ์โลเคนที่พบทั้งหมดในป่าดิบชื้น ส่วนมฬโลเคน (foliose และ fruticose) พบ 92 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 30 และโลเคนบนใบไม้พบ 62 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 20 ของโลเคนทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ (ตารางที่ 4 และภาคผนวก ก)

ป่าดิบชื้นมีโลเคนที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new records) จากการศึกษานี้ 132 ชนิด หรือร้อยละ 44 ของโลเคนที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วย จุลโลเคน 55 ชนิด โลเคนบนใบไม้ 50 ชนิด และมฬโลเคน 27 ชนิด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18, 17 และ 9 ของสายพันธุ์โลเคนที่พบทั้งหมดในป่านี้ (ตารางที่ 4)

โลเคนชนิดใหม่ (new species) ที่พบในป่าดิบชื้นมี 58 ชนิดหรือประมาณ 1 ใน 5 ของสายพันธุ์โลเคนที่พบทั้งหมดในป่านี้ โดยประกอบด้วย จุลโลเคนเป็นส่วนใหญ่ คือ 47 ชนิด มฬโลเคน (foliose และ fruticose) 7 ชนิด และโลเคนบนใบไม้ 4 ชนิด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16, 2 และ 1 ของโลเคนที่พบในป่าดิบชื้น (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 จำนวนชนิด (species) ของไลเคนที่พบทั้งหมด ที่เคยพบมาก่อน ในประเทศไทย (old records) พบเป็นครั้งแรก (new records) ใน ประเทศไทยและชนิดใหม่ (new species) ของโลก ในระบบนิเวศ 7 แห่ง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ชนิดป่า	สถานภาพ	รวม ทั้งหมด & ชนิดใหม่	มีไลเคน เก่า	มีไลเคน ใหม่	ชนิดใหม่	ไลเคน ชนิดใหม่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	รวมทั้งหมด	518	414	164	250	104
	เคยพบ	153	132	85	47	21
	พบครั้งแรก	236	161	61	100	75
	ชนิดใหม่	129	121	18	103	8
ป่าดิบเขา (lower montane forest, LMF)	รวม	215	173	77	96	42
	เคยพบ	75	66	48	18	9
	พบครั้งแรก	96	64	25	39	32
	ชนิดใหม่	44	43	4	39	1
ป่าดึ่งรัง (dry dipterocarp forest, DDF)	รวม	60	60	28	32	0
	เคยพบ	28	28	5	15	0
	พบครั้งแรก	20	20	5	15	0
	ชนิดใหม่	12	12	2	10	0
ป่าดิบแห้ง (dry evergreen forest, DEF)	รวม	224	151	71	80	73
	เคยพบ	88	65	49	16	23
	พบครั้งแรก	106	59	19	40	47
	ชนิดใหม่	30	27	3	24	3
ป่าดิบชื้น (tropical rain forest, TRF)	รวม	298	236	92	144	62
	เคยพบ	108	100	58	42	8
	พบครั้งแรก	132	82	27	55	50
	ชนิดใหม่	58	54	7	47	4
ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest, MDF)	รวม	80	50	18	32	30
	เคยพบ	29	22	13	9	7
	พบครั้งแรก	42	20	5	15	22
	ชนิดใหม่	9	8	0	8	1
ป่ารุ่นสอง (secondary forest, SF)	รวม	184	177	75	102	7
	เคยพบ	83	81	53	28	2
	พบครั้งแรก	67	62	18	44	5
	ชนิดใหม่	34	34	4	30	0
พรรณไม้ปลูก (plantation, P)	รวม	67	67	36	31	0
	เคยพบ	35	35	26	9	0
	พบครั้งแรก	23	23	9	14	0
	ชนิดใหม่	9	9	1	8	0

ไลเคนที่พบเฉพาะในป่าดิบชื้น ได้แก่ *Cyclographina cubana*, *C. immaculata*, *Buellia disciformis*, *Bulbothrix pigmentacea*, *Leptogium crispatellum*, *Laurera tuberculosa*, *Myriotrema thailandicum*, *Ocellularia kansriae*, *O. arecae*, *O. ascidioidea*, *O. concolor*, *O. crassa*, *Parmelinopsis microlobulata*, *Parmotrema rubromarginatum*, *P. zollingeri*, *Physcidia wrightii*, *Pyxine maculata*, *Relicina connivens*, *R. palmata*, *R. relicinaula*, *R. subabstrusa*, *R. subconnivens*, *R. sublimbata*, *Sticta orbicularis*, *Thelotrema rhododiscum*, *Usnea rubicunda* และ *U. subflorida* เป็นต้น

✱ ไลเคนในป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest)

ป่าดิบแล้งมีลักษณะภูมิอากาศและสภาพป่าคล้ายคลึงกับป่าดิบชื้น แตกต่างกันว่าป่าดิบแล้งได้รับน้ำฝนน้อยกว่าป่าดิบชื้นเล็กน้อย ป่าดิบแล้งมีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนมากเป็นอันดับสองในพื้นที่อุทยานฯ ไลเคนที่พบในป่าดิบแล้งมี 224 ชนิด (ตารางที่ 4) หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดในอุทยานฯ โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) 80 ชนิด หรือร้อยละ 36 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ โดยมีไลเคนบนใบไม้ (foliicolous) และมหไลเคน (foliose และ fruticose) ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันคือ 73 และ 71 ชนิด ตามลำดับ (ตารางที่ 4) โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 และ 31 ของสายพันธุ์ไลเคนที่พบทั้งหมดในป่าดิบแล้ง



Graphis duplicata



Collema kaniense



Usnea undulata

ไลเคนที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) มาจากป่าดิบแล้ง 106 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 47 ของสายพันธุ์ไลเคนที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วยไลเคนบนใบไม้มากที่สุดคือ 47 ชนิด โดยมีจุลไลเคน 40 ชนิด และมหไลเคน 19 ชนิดหรือคิดเป็นสัดส่วนตามลำดับประมาณร้อยละ 21, 18 และ 8 ของไลเคนทั้งหมดในป่าดิบแล้ง (ตารางที่ 4)

ป่าดิบแล้ง พบไลเคนสายพันธุ์ใหม่ (new species) 30 สายพันธุ์ หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วย จุลไลเคน (crustose) มากที่สุดคือ 24 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 11 ของสายพันธุ์ที่พบในป่าดิบแล้ง โดยมีมหไลเคนและไลเคนบนใบไม้เพียงส่วนน้อยคือกลุ่มละ 3 ชนิด (ตารางที่ 4)

ไลเคนที่พบเฉพาะในป่าดิบแล้ง ได้แก่ *Acanthothecis consocians*, *Astrothelium galbineum*, *Bulbothrix ventricosa*, *Collema kawaiense*, *Dirinaria confluens*, *Graphis duplicata*, *Graphina lumbschii* var. *deficiens*, *Leptogium cochleatum*, *Parmelinopsis jamesii* WBE *Usnea undulata* เป็นต้น

✽ ไลเคนในป่าดิบเขา (lower montane rain forest)

ป่าดิบเขาเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่มีภูมิอากาศแตกต่างจากระบบนิเวศอื่น และพบความหลากหลายชนิดของไลเคนมากเป็นอันดับสาม โดยพบไลเคนทั้งหมด 215 ชนิด หรือเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 42 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) มากที่สุด คือ 96 ชนิดหรือร้อยละ 45 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในป่าดิบเขา โดยมีมหไลเคน (foliose และ fruticose) 77 ชนิด (ตารางที่ 4) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของสายพันธุ์ไลเคนที่พบทั้งหมดในป่าชนิดนี้ และมีไลเคนบนใบไม้ (foliicolous) 42 ชนิด โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของสายพันธุ์ไลเคนที่พบทั้งหมดในป่าดิบเขา

ป่าดิบเขามีสายพันธุ์ไลเคนที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) จำนวน 96 ชนิดหรือร้อยละ 46 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าดิบเขา โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) 39 ชนิด ไลเคนบนใบไม้ 32 ชนิด และมหไลเคน (foliose และ fruticose) 25 ชนิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 18, 16, และ 12 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในป่าชนิดนี้ (ตารางที่ 4)

ไลเคนสายพันธุ์ใหม่ (new species) ที่พบในป่าดิบเขามี 44 ชนิดหรือเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) เกือบทั้งหมด คือ 39 ชนิดหรือประมาณร้อยละ 18 ของสายพันธุ์ที่พบในป่านี้ โดยมีมหไลเคนและไลเคนบนใบไม้เป็นส่วนน้อยคือ กลุ่มละ 4 และ 1 ชนิด ตามลำดับ (ตารางที่ 4)

ไลเคนที่พบเฉพาะในป่าดิบเขา ได้แก่ *Astrothelium cinnamomeum*, *Biatora sphaeroides*, *Campylothelium nitidum*, *Cladonia cartilaginea*, *C. macilenta*, *C. mauritiana*, *C. singhii*, *C. squamosa*, *C. tenuicaulis*, *Graphis treubii*, *Heterodermia flabellata*, *H. hypocraea*, *Hypotrachyna adducta*, *H. brevirhiza*, *H. coorgiana*, *H. ducalis*, *H.*



Hypotrachyna brevirhiza



Cladonia macilenta



Heterodermia sp.

gondylophora, *H. osseopalba*, *H. sublaevigata*, *Myriotrema grandisporum*, *M. subminutum*, *Parmeliella mariana*, *Polymeridium catapastum*, *Pyxine convexior*, *Sarcographa intricans*, *Sticta fuliginosa*, *Usnea baileyi* และ *U. bismolluscula* เป็นต้น

* ไลเคนในป่ารุ่นสอง (secondary forest)

ป่ารุ่นสองเป็นป่าที่กำลังเติบโตหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ (succession) ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นหมู่บ้านหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นมาก่อนที่มีประกาศจัดตั้งเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นพื้นที่ส่วนน้อยมากในเขตอุทยานฯ โดยอยู่ในเขตป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ แต่พบความหลากหลายของสายพันธุ์ไลเคนสูงเป็นอันดับที่สี่ ไลเคนที่พบมี 184 ชนิด หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ ประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) เป็นส่วนใหญ่ คือ 102 ชนิดหรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ โดยมีมหไลเคน (foliose และ fruticose) 75 ชนิดหรือประมาณร้อยละ 40 ของสายพันธุ์ที่พบในป่ารุ่นสอง และมีไลเคนบนใบไม้เพียง 7 ชนิดหรือเพียงประมาณร้อยละ 4 ของสายพันธุ์ที่พบในป่านี้ (ตารางที่ 4)



Graphis elegans

ป่ารุ่นสองมีไลเคนสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new records) 67 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 3 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดในป่านี้ โดยส่วนใหญ่เป็นจุลไลเคนถึง 44 ชนิดหรือประมาณ 1 ใน 4 ของสายพันธุ์ที่พบในป่าประเภทนี้ โดยมีมหไลเคน (foliose และ fruticose) 18 ชนิด คือประมาณ 1 ใน 10 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดในป่ารุ่นสอง (ตารางที่ 4)



Phaeographis extrusa

ไลเคนชนิดใหม่ (new species) ที่พบในป่ารุ่นสองมีถึง 34 ชนิด หรือประมาณ 1 ใน 5 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ เกือบทั้งหมดเป็นจุลไลเคน (crustose) คือพบถึง 30 ชนิด โดยมีมหไลเคน (foliose และ fruticose) เพียง 4 ชนิด



Phaeographis submaculata

ไลเคนที่พบเฉพาะในป่ารุ่นสอง ได้แก่ *Buellia curatellae*, *B. tinctoria*, *Bulbothrix sensibilis*, *Cyclographina citri*, *Graphina suberythrella*, *Graphis elegans*, *G. tenella*, *G. turgidula* var.

norstictica, *Hyperphyscia adglutinata*, *Phaeographis extrusa*, *P. inustoides*, *P. submaculata*, *Physcia erumpens*, *Polymeridium albocinereum*, *Pyxine sorediata*, *P. subcinerea* และ *Ramalina* cf. *fimbriata* เป็นต้น

✱ ไลเคนในป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)

ป่าเบญจพรรณที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นป่าที่ไม่มีไม้สักเป็นส่วนประกอบ มีพื้นที่น้อยในเขตอุทยานฯ ไลเคนที่พบมี 80 ชนิดหรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ ประกอบด้วยจุลไลเคน 32 ชนิด หรือร้อยละ 40 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดในป่าเบญจพรรณ โดยมีไลเคนบนใบไม้ 30 ชนิดและมหลไลเคน (foliose และ fruticose) 18 ชนิด หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 และ 23 ของไลเคนที่พบในป่านี้ (ตารางที่ 4)

ไลเคนที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new records) มี 42 ชนิด หรือประมาณกึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ที่พบในป่าเบญจพรรณ โดยประกอบด้วยไลเคนบนใบไม้มากที่สุดถึง 22 ชนิด รองลงมาคือ จุลไลเคน 15 ชนิด และมหลไลเคน 5 ชนิด (ตารางที่ 4)

ไลเคนชนิดใหม่ (new species) พบในป่าเบญจพรรณ 9 ชนิด โดยเป็นจุลไลเคน (crustose) เกือบทั้งสิ้น คือ 8 ชนิด และเป็นไลเคนบนใบไม้ 1 ชนิด (ตารางที่ 4)



Graphis kakaduensis

ไลเคนที่พบเฉพาะป่าเบญจพรรณ ได้แก่

Bacidia cf. *medialis*, *Graphis kakaduensis* และ *Physcia integrata*

✱ ไลเคนในป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest)

ป่าเต็งรังเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้งแล้งมาก มีไฟป่าบ่อยครั้ง พบไลเคนทั้งหมด 60 ชนิด หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ ประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) 32 ชนิด และมหลไลเคน (foliose และ fruticose) 28 ชนิด โดยไม่พบไลเคนบนใบไม้ เนื่องจากพรรณไม้เป็นป่าผลัดใบ ใบไม้ไม่มีอายุมากพอที่ไลเคนเกาะอาศัยได้

ป่าเต็งรังมีไลเคนสายพันธุ์ที่พบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (new records) 20 ชนิด หรือ 1 ใน 3 ของสายพันธุ์ที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) มากที่สุด คือ 15 ชนิดหรือร้อยละ 25 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในป่าเต็งรัง โดยมีมหลไลเคน (foliose และ fruticose) 5 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 (ตารางที่ 4)



Graphis immersicans

ไลเคนสายพันธุ์ใหม่ (new species) ที่พบในป่าเต็งรังมี 12 ชนิด หรือเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 5 ของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในป่าประเภทนี้ โดยประกอบด้วยจุลไลเคน (crustose) เกือบทั้งหมดคือ 10 ชนิด หรือประมาณร้อยละ 17 ของสายพันธุ์ที่พบในป่านี้ โดยมีมหไลเคนพวกฟิสิโอส 2 ชนิด (ตารางที่ 4)

ไลเคนที่พบเฉพาะในป่าเต็งรัง ได้แก่

Buellia polyspora และ *Graphis immersicans*

* ไลเคนบนพรรณไม้ปลูก (plantation)

พรรณไม้ปลูกในที่นี้หมายถึง พรรณไม้ที่ปลูกในพื้นที่ใช้งานในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เช่น บริเวณที่พัก สำนักงาน ริมทาง และสนามกอล์ฟเดิม เป็นต้น พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในที่โล่งได้รับแสงเต็มที่ จึงพบไลเคนเติบโตได้ดี ไลเคนที่พบมี 67 ชนิด หรือเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของสายพันธุ์ไลเคนทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ โดยประกอบด้วยมหไลเคน (foliose และ fruticose) 36 ชนิด



Heterodermia isidiophora

หรือเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดที่พบในพื้นที่เหล่านี้ และจุลไลเคน (crustose) 31 ชนิดหรือเกือบกึ่งหนึ่ง โดยไม่พบไลเคนบนใบไม้



Laurera megasperma

สายพันธุ์ไลเคนบนไม้ปลูกที่เป็นรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records) มี 23 ชนิด หรือเกือบ 1 ใน 3 ของสายพันธุ์ที่พบบนไม้ปลูก โดยประกอบด้วยจุลไลเคน 14 ชนิด และมหไลเคน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 21 และ 13 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมดจากไม้ปลูก



Pyxine cocos

ไลเคนชนิดใหม่ (new species) ที่พบจากไม้ปลูกมีถึง 9 ชนิด โดยประกอบด้วยจุลไลเคนเกือบทั้งหมด คือ 8 ชนิด และมีมหไลเคน 1 ชนิด โดยไม่มีไลเคนบนใบไม้

ไลเคนที่พบเฉพาะในพรรณไม้ปลูก คือ

Heterodermia isidiophora, *Laurera megasperma* และ *Pyxine cocos* เป็นต้น

* ไลเคนบนเรือนยอด (canopy lichens)

ไลเคนบนเรือนยอดที่รายงานในครั้งนี้มีพื้นที่เก็บตัวอย่างอยู่ในป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ทำการเก็บตัวอย่างจากป่าดิบเขาและป่าอื่นๆ บ้าง จำแนก

ไลเคนได้ 129 ชนิด 46 สกุลใน 25 วงศ์ ประกอบด้วย
มหไลเคน (macrolichens) 82 ชนิด และจุลไลเคน
(microlichens) 47 ชนิด โดยพบความหลากหลาย
ชนิดของไลเคนทั้งสองกลุ่มมากที่สุดในป่าดิบชื้น
คือพบถึง 90 ชนิด ป่าดิบเขาพบมากเป็นอันดับสอง
คือ 39 ชนิด รองลงมาได้แก่ป่าดิบแล้ง พบ 21 ชนิด
ส่วนป่าอื่นๆ ที่ยังไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้อย่าง
เข้มข้น พบไลเคน 6-14 ชนิด



✱ การแพร่กระจายของไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens) ในระบบนิเวศต่างๆ

การศึกษาไลเคนบนใบไม้ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จากตัวอย่างทั้งหมด
ประมาณ 2,000 ตัวอย่าง เก็บจากทุกระบบนิเวศ จำแนกสายพันธุ์ได้ 104 ชนิด
(species) 30 สกุล (genus) ใน 15 วงศ์ (family) โดย
พบความหลากหลายชนิดมากที่สุดในป่าดิบแล้งคือ
พบถึง 73 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 70 ของไลเคนบน
ใบไม้ทั้งหมดที่พบในการเก็บตัวอย่างครั้งนี้ รอง
ลงมาพบในป่าดิบชื้น 62 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60
ของไลเคนบนใบไม้ทั้งหมดที่พบในอุทยานฯ โดย
ป่าดิบเขาพบความหลากหลายสูงเป็นอันดับสาม
พบ 42 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 41 ของไลเคนบนใบไม้
ป่าเบญจพรรณพบ 30 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 29 และ
ป่ารุ่นสองพบเพียง 7 ชนิด โดยไม่พบในป่าเต็งรัง
และป่าปลูก เนื่องจากภูมิอากาศแห้งแล้งและพรรณไม้
ผลัดใบในฤดูแล้ง



Porina sphaerocephala



Byssoloma subdiscordans



Sporopodium argillaceum

ไลเคนบนใบไม้ที่มีการแพร่กระจายดีมาก
พบได้ในระบบนิเวศทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ *Porina*
atropunctata, *P. conica*, *P. sphaerocephala* และ
P. rufula

ไลเคนบนใบไม้ที่มีการแพร่กระจายดี
พบได้ในระบบนิเวศ 4 ประเภท ได้แก่ *Byssoloma*
subdiscordans, *Calopadia puiggarii*, *Caprettia*
amazonensis, *Chroodiscus verrucosus*, *Mazosia*
melanophthalma, *M. phyllosema*, *Porina atriceps*,
Porina epiphylla, *P. fulvella*, *P. minutissima*,
P. tetramera, *Sporopodium argillaceum* และ
S. phyllocharis



Mazosia melanophthalma



Chroodiscus verrucosus



Byssoloma fadenii



Strigula concreta



Mazossia paupercula



Strigula melanobapha



Coenogonium subluteum

ไอเคนบนใบไม้ที่มีการแพร่กระจายเฉพาะพบได้ในเฉพาะระบบนิเวศท้องประเทศเดียว มีดังนี้

● ไอเคนบนใบไม้ที่พบเฉพาะในป่าดิบแห้ง ได้แก่ *Byssoloma fadenii*, *Echinoplaca pellicula*, *E. tetrapla*, *Enterographa angustissima*, *Gyalectidium novoguineense*, *Lasioloma phycophilum*, *Mazossia paupercula*, *Porina multiloculata*, *P. subnucula*, *Strigula concreta*, *S. maculata*, *S. melanobapha*, *S. nitidula*, *S. obducta*, *Tapellaria nigrata*, *Tricharia valnicoi*, *Trichothelium ake-assii*, *T. alboatrum*, *T. bipindense* และ *T. javanicum*

● ไอเคนบนใบไม้ที่พบเฉพาะในป่าดิบชื้น ได้แก่ *Arthonia cyanea* var. *cyanea*, *Aulaxina microphana*, *Calenia leptocarpa*, *C. thelotremella*, *Chroodiscus mirificus*, *Coenogonium dilucidum*, *C. isidiiferum*, *C. luteum*, *C. subluteum*, *Fellhanera bouteillei*, *F. emarginata*, *F. lambinonii*, *F. rhipidophylli*, *Graphis* cf. *cylindrica*, *Leptogium cyanescens*, *Mazossia dispersa*, *Porina kamerunensis* และ *P. leptosperma*

● ไอเคนบนใบไม้ที่พบเฉพาะในป่าดิบเขา มีเพียงชนิดเดียว ได้แก่ *Byssoloma gahavisankum*

● ไอเคนบนใบไม้ที่พบเฉพาะในป่าเบญจพรรณ ได้แก่ *Byssoloma guttiferiae*, *Calenia despeza*, *Eremothecella macrocephala* และ *Tricharia demonlinii*



Fellhanera bouteillei



Fellhanera lambinonii

การศึกษาภูมิอากาศเฉพาะแห่ง ที่ไอลเคนเติบโต



ไอลเคนเกิดขึ้นและเติบโตในบริเวณที่จำเพาะ เช่น ด้านใดด้านหนึ่งของลำคั้นหรือที่หลังกิ่งไม้บนเรือนยอด ส่วนท้องกิ่งไม้พบไอลเคน บริเวณเหล่านี้คือ ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง (microclimate) ที่มีสภาพแวดล้อม เช่น แสง ความชื้น อุณหภูมิ แตกต่างจากภูมิอากาศของที่อื่นๆ

การบันทึกภูมิอากาศเฉพาะแห่งในบริเวณขอบเขตที่ไอลเคนเติบโตและนอกขอบเขตการเติบโตกระทำในป่าดิบชื้น ป่าดงรัง และป่าดิบเขา ทุกฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยทำการบันทึกข้อมูลทุก 10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมงพบว่า ความเข้มแสง ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ และอุณหภูมิอากาศที่ไอลเคนเจริญเติบโตได้แตกต่างจากบริเวณข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัดในทุกระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเติบโตและแพร่กระจายของไอลเคน ได้แก่

✧ ความชื้นในบรรยากาศ

ไอลเคนไม่มีรากสำหรับดูดน้ำจากที่เกาะอาศัย แต่แหล่งสะสมของไอลเคนดูดซับน้ำจากบรรยากาศในสภาพของหมอก ฝน น้ำค้าง เพื่อใช้ในการเติบโต และไอลเคนสูญเสียน้ำจากแหล่งสะสมโดยการระเหยได้รวดเร็วเนื่องจากไอลเคนไม่มีโครงสร้างที่ป้องกันการสูญเสียน้ำ ความชื้นในแหล่งสะสมจึงสมดุลกับความชื้นในบรรยากาศ

การศึกษาค้นคว้าพบว่าในเวลากลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลง ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศสูงถึงจุดอิ่มตัวหรือใกล้จุดอิ่มตัวในทุกฤดูกาลและทุกระบบนิเวศที่ทำการศึกษาในอุทยานฯ ทำให้แหล่งสะสมของไอลเคนดูดซับน้ำในบรรยากาศไว้ได้

เมื่อได้รับแสงในเวลาเช้า จึงทำการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างสารอินทรีย์ โดยกระบวนการนี้สิ้นสุดลงเมื่อน้ำหมดไปจากแทลลัส ดังนั้นการที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศสูงถึงจุดอื่นตัวในเวลากลางวัน จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ไลเคนดำรงชีวิตอยู่ได้ในฤดูแล้ง หรือในสภาพพื้นที่ที่ปราศจากน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรืออาจรวมถึงในที่อื่นๆ ด้วย

★ แสง

แสงเป็นแหล่งของพลังงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก บริเวณที่มีไลเคนเติบโตในทุกระบบนิเวศ วัดความเข้มของแสงในช่วงเช้า (6.00–10.00 นาฬิกา) ได้เกิน $200 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ส่วนบริเวณที่ไม่มีไลเคนเติบโตวัดความเข้มของแสงได้ต่ำกว่านี้ แสงในช่วงเช้ามีความสำคัญต่อการเติบโตและการเกิดไลเคนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่แทลลัสสะสมน้ำไว้สูงจากการดูดซับน้ำจากบรรยากาศไว้ตลอดคืน ทำให้มีวัตถุดิบที่จะใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างสารอินทรีย์เมื่อไลเคนได้รับแสงที่เหมาะสมในช่วงเช้า จึงทำการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ กระบวนการนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อน้ำหมดไปจากแทลลัส ซึ่งเกิดขึ้นรวดเร็วมาก อาจไม่เกิน 10 นาฬิกาในวันที่ไม่มีฝนตก เนื่องจากไลเคนไม่มีโครงสร้างในการเก็บรักษาน้ำไว้ในแทลลัส หลังจากนั้นแล้วไลเคนเข้าสู่การพักตัว

★ อุณหภูมิ

อุณหภูมิมีผลต่ออัตราของปฏิกิริยาทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต เช่น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสูงสุดเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 25°C โดยอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่านี้ทำให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง ส่วนอัตราการหายใจของไลเคนเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เป็นต้น อุณหภูมิจึงมีผลต่ออัตราการเติบโตของไลเคน อุณหภูมิบริเวณที่พบไลเคนเติบโตทุกระบบนิเวศวัดได้ $17\text{--}40^{\circ}\text{C}$ ส่วนบริเวณนอกขอบเขตการเติบโตของไลเคนวัดได้ $18\text{--}37^{\circ}\text{C}$ โดยพบว่าบริเวณที่ไลเคนเติบโตมีความแตกต่างของอุณหภูมิในเวลากลางวัน-กลางคืน มากกว่าบริเวณนอกขอบเขตการเติบโตของไลเคน



อุณหภูมิอาจมีใช้ปัจจัยวิกฤตที่มีอิทธิพลต่อการเกิดขึ้นของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องจากอุณหภูมิที่วัดได้ อยู่ในช่วงที่สิ่งมีชีวิตทั่วไปสามารถเติบโตได้ แต่อาจมีอิทธิพลต่ออัตราการเติบโตและกระบวนการทางชีวภาพของไลเคน เนื่องจากพบไลเคนบางชนิด เช่น *Heterodermia* sp. เติบโตได้ในป่าดิบเขาเท่านั้น ป่าดิบเขามีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่าระบบนิเวศอื่น ทั้งนี้อิทธิพลของอุณหภูมิที่จำเพาะต่อการเกิดและแพร่กระจายของไลเคน ควรต้องทำการศึกษาต่อไป



การเติบโตของไลเคนวัดจากขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งที่เพิ่มขึ้น โดยทำการวัดทุกฤดูกาลในระบบนิเวศ 5 แห่ง คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่ารุ่นสอง ประกอบด้วยไลเคน 306 ตัวอย่าง พบว่าการเติบโตของไลเคนในเขตร้อน (tropic) ซึ่งยังไม่เคยมีผู้ใคร่ครวญมาก่อน แตกต่างจากการเติบโตของไลเคนในเขตอบอุ่น (temperate) อย่างมาก โดยไลเคนในเขตร้อนหลายชนิดมีอัตราการเติบโตสูงสุดวัดได้ถึง 20 มิลลิเมตร/ปี ส่วนบางชนิดเติบโตช้ามากโดยไม่สามารถวัดการเติบโตได้ในช่วง 1 ปี อัตราการเติบโตของไลเคนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีดังนี้

* อัตราการเติบโตของไลเคนพวกโฟลีโอสมและครัสโตส

อัตราการเติบโตของไลเคนวัดจากความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง (ในที่นี้มีหน่วยเป็นเดือนหรือปี) ไลเคนพวกโฟลีโอสมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าพวกครัสโตส คือ วัดได้ 6 มิลลิเมตร/ปี โดยอัตราการเติบโตสูงสุดวัดจากไลเคนหนึ่งแท่งมีค่า 20.4 มิลลิเมตร/ปี ต่ำสุด 2.4 มิลลิเมตร/ปี ส่วนไลเคนพวกครัสโตสมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 1.2 มิลลิเมตร/ปี โดยอัตราการเติบโตสูงสุดมีค่า 12 มิลลิเมตร/ปี ต่ำสุดวัดค่าไม่ได้ คือ ไม่พบการขยายตัวของแท่งใน 1 ปี (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 อัตราการเติบโตของไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วัดจากไลเคน 306 ตัวอย่าง ประกอบด้วยไลเคนพวกโฟลีโอสม 160 ตัวอย่าง และครัสโตส 146 ตัวอย่าง ในระบบนิเวศ 5 แห่ง และในฤดูกาลต่างๆ ระหว่าง มิถุนายน พ.ศ. 2542 ถึง มกราคม พ.ศ. 2544

ไลเคน (lichens)	อัตราการเติบโต (มิลลิเมตร/ปี)		
	เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด
โฟลีโอสม (foliose)	6	20.4	2.4
ครัสโตส (crustose)	1.2	12	วัดไม่ได้

* อัตราการเติบโตของไลเคนในระบบนิเวศต่างๆ

อัตราการเติบโตของไลเคนในแต่ละระบบนิเวศมีค่าแตกต่างกัน เนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน

ไลเคนพวกโพลีโอส

อัตราการเติบโตเฉลี่ยของไลเคนพวกโพลีโอสที่มีค่าสูงสุด วัดได้จาก ป่ารุ่นสอง คือ 10.8 มิลลิเมตร/ปี รองลงมาได้แก่ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 6 มิลลิเมตร/ปี ส่วนป่าดิบเขา ไลเคนกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับป่าดิบชื้นวัดได้ 4.8 มิลลิเมตร/ปี

ไลเคนพวกครัสโตส

อัตราการเติบโตเฉลี่ยของไลเคนพวกครัสโตส วัดได้สูงสุดจากป่าดิบชื้นและป่าเต็งรัง มีค่า 2.4 มิลลิเมตร/ปี รองลงมาได้แก่ ป่ารุ่นสอง วัดได้ 1.2 มิลลิเมตร/ปี ป่าดิบแล้ง 1.08 มิลลิเมตร/ปี และสังเกตการเติบโตไม่ได้ในป่าดิบเขา อาจเนื่องจากมีตัวอย่างที่ศึกษาน้อย

✧ อัตราการเติบโตของไลเคนในฤดูกาลต่างๆ

ฤดูฝนเป็นช่วงที่ไลเคนมีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยสูงกว่าฤดูหนาวและฤดูร้อนประมาณ 4 เท่า โดยไลเคนพวกโพลีโอสมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึง 1.34 มิลลิเมตร/เดือน รองลงมาคือ ฤดูร้อนและฤดูหนาว ซึ่งมีอัตราการเติบโต 0.34 และ 0.30 มิลลิเมตร/เดือน ตามลำดับ ส่วนไลเคนพวกครัสโตสมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในฤดูฝน 0.25 มิลลิเมตร/เดือน ส่วนฤดูหนาวและฤดูร้อน วัดได้ 0.11 และ 0.05 มิลลิเมตร/เดือน



Leptogium cyanescens



Parmotrema tinctorum



*Parmotrema
praesorediosum*

✧ อัตราการเติบโตสูงสุดของไลเคนในระบบนิเวศต่างๆ

อัตราการเติบโตสูงสุดของไลเคนวัดจากการขยายตัวของเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งไม้หนึ่งแท่ง ไม้ของไลเคนชนิดใดๆ ในระยะเวลาหนึ่ง

อัตราการเติบโตสูงสุดของไลเคนพวกโพลีโอส ในระบบนิเวศต่างๆ

มีค่าดังนี้

- ป่ารุ่นสอง วัดได้จาก *Parmotrema praesorediosum* มีค่า 20.4 มิลลิเมตร/ปี
- ป่าดิบแล้ง วัดได้จาก *Leptogium cyanescens* มีค่า 16.8 มิลลิเมตร/ปี
- ป่าเต็งรัง วัดได้จาก *Parmotrema tinctorum* มีค่า 13.2 มิลลิเมตร/ปี

● ป่าดิบชื้น วัดได้จาก *Coccocarpia erythroxyli* มีค่า 10.8 มิลลิเมตร/ปี

● ป่าดิบเขา วัดได้จาก *Heterodermia hypoleuca* มีค่า 8.4 มิลลิเมตร/ปี

อัตราการเติบโตสูงสุดของไลเคน
พวกครัสโตส ในระบบนิเวศต่างๆ
มีค่าดังนี้

● ป่าดิบชื้น วัดได้จาก *Letrouitia vulpina*
มีค่า 9.6 มิลลิเมตร/ปี

● ป่ารุ่นสอง วัดได้จากไลเคนนิรนาม
(Unidentify) มีค่า 8.4 มิลลิเมตร/ปี

● *Lecanora* sp.2 มีค่า 6.0 มิลลิเมตร/ปี

● ป่าดิบแห้ง วัดได้จาก *Brigantiaea* sp.1
มีค่า 4.8 มิลลิเมตร/ปี

● ป่าดงรัง วัดได้จาก *Laurera benguelensis*
มีค่า 2.4 มิลลิเมตร/ปี

● ป่าดิบเขา สังเกตการเติบโตไม่ได้ เนื่องจากมีตัวอ่อนอย่างน้อย



Letrouitia vulpina



Laurera benguelensis

โลหะหนักในไลเคน

ไลเคนไม่มีเนื้อเยื่อที่ผิวหน้า เช่น คิวทิเคิล (cuticle) หรือไข (wax) เช่นพืชชั้นสูง ซึ่งป้องกันการผ่านเข้าออกของอากาศและน้ำในใบพืช แต่ไลเคนมีชั้นคอร์เท็กซ์ (cortex) ซึ่งประกอบด้วยเซลล์ใยของราประสานกันแน่น แต่ชั้นคอร์เท็กซ์ของไลเคนไม่สามารถยับยั้งการผ่านเข้า-ออกของน้ำและสิ่งต่างๆ ในบรรยากาศได้ ไลเคนจึงสามารถสะสมสิ่งต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศได้ดีและใช้เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพอากาศอย่างแพร่หลาย

จากการวิเคราะห์โลหะหนักในไลเคน 13 ชนิด เช่น *Parmotrema tinctorum*, *Rimelia reticulata*, *Hypotrachyna* sp., *Parmotrema* sp., *Usnea* sp. รวมทั้งหมด 32 ตัวอย่าง ซึ่งสุ่มเก็บจากป่าดิบเขา ป่ารุ่นสอง และป่าปลูก ในฤดูกาลต่างๆ คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว พบว่าโลหะหนักแต่ละชนิดในไลเคนมีค่าแปรปรวนค่อนข้างสูง ดังแสดงในตารางที่ 6 แต่อยู่ในช่วงความเข้มข้นที่พบในชนบทของยุโรป ซึ่งแสดงว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีคุณภาพอากาศค่อนข้างดี



Hypotrachyna sp.

ตารางที่ 6 การสะสมโลหะหนักของไลเคน 13 ชนิด รวม 32 ตัวอย่างที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยการเก็บตัวอย่างทุกฤดูกาลจากป่าดิบเขา ป่ารุ่นสอง และพรวนไม้ปลูก ในระหว่าง พ.ศ. 2543-2545

โลหะหนัก (ในโครกรัม กรัม)	ทองแดง (Cu ²⁺)	เหล็ก (Fe ³⁺)	แมงกานีส (Mn ²⁺)	นิกเกิล (Ni ²⁺)	ตะกั่ว (Pb ²⁺)	สังกะสี (Zn ²⁺)	แคดเมียมโคบอลต์	(Cd ²⁺) (Co ²⁺)
เฉลี่ย SD	17±9	332±253	76±94	3±3	14±39	36±28	ไม่พบ	ไม่พบ
(ต่ำสุด-สูงสุด)	(0-43)	(253-1055)	(8-462)	(0-14)	(0-162)	(0-142)		



ราในไลเคน (mycobiont) เป็นหน่วยที่สร้างสารธรรมชาติในไลเคน โดยเฉพาะสารที่เป็น secondary metabolites สารเหล่านี้มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ เช่น สารปฏิชีวนะ (antibiotics) สารสี (pigments) กรดอินทรีย์ (organic acids) และเอนไซม์ เป็นต้น การแยกจากไลเคน มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสารออกฤทธิ์ชนิดใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต



การแยกสายพันธุ์ราที่บริสุทธิ์จากไลเคน ทำด้วยการแยกสปอร์เดี่ยว (single spore isolation) จากไลเคน 250 ตัวอย่าง ได้จำนวน 60 สายพันธุ์ โดยได้มีการศึกษาฤดูกาลที่เหมาะสมในการงอกของสปอร์ อัตราการเติบโตของราด้วย





ก

ารเก็บรักษาสายพันธุ์ไลเคนในพิพิธภัณฑ์และ ลงทะเบียนพิพิธภัณฑ์ไลเคนในระบบสากล



ตัวอย่างไลเคนที่ทำการวิเคราะห์สายพันธุ์แล้ว ได้ทำการบรรจุลงซองบรรจุตัวอย่างตามมาตรฐานสากล โดยมีแผ่นป้ายหน้าซองที่ระบุข้อมูลของไลเคน เช่น สถานที่เก็บ ระบบนิเวศที่พบ ความสูงจากระดับน้ำทะเล วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บ และข้อมูลจำเพาะของไลเคนนั้นๆ เช่น ชนิดและขนาดของสปอร์ รวมทั้งสารเคมีที่พบ เป็นต้น ตัวอย่างเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ไลเคนเพื่อใช้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบในการศึกษาไลเคนต่อไป และเป็นข้อมูลอ้างอิงในด้านความหลากหลายทางชนิดและการแพร่กระจายของไลเคน

พิพิธภัณฑ์ไลเคนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำการจดทะเบียนกับระบบพิพิธภัณฑ์สากล คือ Index Herbarium Data base โดยได้มีอักษรย่อ RAMK ประจำตัวอย่าง (specimens) ของพิพิธภัณฑ์นี้



โลเคนที่สามารถจำแนกได้ถึงชนิดตามหลักอนุกรมวิธานที่เป็นสากล โดยการตรวจสอบจากการพิมพ์เผยแพร่ (publications) และคู่มือการจำแนก (keys) มีจำนวน 518 ชนิดได้ทำการถ่ายภาพ วาดลายเส้น ส่วนที่สำคัญและบรรยายลักษณะของชนิดไว้และได้บันทึกลงในฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐาน และใช้เป็นหลักในการอ้างอิงสำหรับการศึกษาในอนาคต



จากการสำรวจไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทำให้มีข้อมูลด้านไลเคน
เพิ่มพูนขึ้นมาก จึงได้จัดทำ web site โดยข้อมูลไลเคนส่วนหนึ่งได้ทำการเผยแพร่
อยู่ใน web site ของมหาวิทยาลัย คือ www.ru.ac.th โดยมีข้อมูลอีกมากที่ไม่สามารถ
บรรจุลงใน web site ได้ ผู้สนใจศึกษาไลเคนควรมาศึกษาด้วยตนเองที่หน่วยวิจัย
ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ web
site ไลเคนของหน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้เชื่อมโยง (link) กับ
web site ไลเคนในต่างประเทศด้วย

อนาคตของไลเคน



* การใช้ประโยชน์จากไลเคน

ไลเคนมีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกมาก เนื่องจากมีสารธรรมชาติที่พบโครงสร้างแล้วมากกว่า 700 ชนิด และยังมีการพบสารใหม่อยู่เสมอ ไลเคนถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ทั้งในด้านยา เกษษกรรม อาหาร เครื่องดื่ม สีย้อม น้ำหอม เป็นต้น โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ไลเคนอย่างต่อเนื่อง

ประเทศจีนมีไลเคนจำหน่ายในร้านขายยา โดยชาวจีนดื่มชาที่ทำจากไลเคน 2 ชนิด คือ *Thamnolia vermicularis* และ *Teloschistes* sp.

ไลเคนที่ใช้ในการประกอบอาหารจีน คือ *Lobaria* sp.

ลูกกวาดสมุนไพรจากไลเคน *Cetraria islandica* มีขายทั่วไปในยุโรป

ฮาระจับก้นดัวที่จำหน่ายทาง e-commerce จึงมีส่วนประกอบเป็นสารจากไลเคน



ชาจากไลเคน
Thamnolia vermicularis
ขายในประเทศจีน



Teloschistes sp.



Lobaria sp.



Cetraria islandica



Usnea sp.

การใช้ประโยชน์ไลเคนในประเทศไทยยังคงค่อนข้างจำกัด ชาวบ้านรู้จักใช้ฝอยลมหรือไลเคน *Usnea* sp. สัมผัสเพื่อรักษาอาการปวดท้อง การหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไลเคนมุ่งเน้นด้านเภสัชกรรม เช่น สารต้านมะเร็ง และมาเลเรีย หรือยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์เป็นสำคัญ คุณค่าของไลเคนด้านอื่นยังมีอีกมากที่สามารถนำมาวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ไลเคนจึงควรกระทำในด้านอื่นให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจำเป็นต้องประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรมต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยและพัฒนาค่อนข้างสูง หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยจึงควรระลึกรถึงปัญหาและอุปสรรคด้านนี้ด้วย

✱ การอนุรักษ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน คือ การที่ทรัพยากรนั้นมีให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคต ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในเขตที่มีการพัฒนาเมืองและอุตสาหกรรมที่ไม่มีการควบคุมมลพิษจะไม่พบไลเคนเติบโต ประกอบกับศักยภาพในการนำไลเคนใช้ประโยชน์ยังมีอีกมาก ซึ่งอาจทำให้ไลเคนสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติได้

การศึกษาวิจัยในการดำรงชีวิต ไลเคนและรักษาสายพันธุ์ไว้ทั้งในและนอกที่อยู่อาศัย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องกระทำควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากไลเคนเพื่อให้สามารถรักษามรดกกรรมของทรัพยากรชีวภาพนี้ไว้ได้

✱ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน

การศึกษาวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ พบไลเคนสายพันธุ์ใหม่ของโลก (new species) จากไลเคนเพียง 1 วงศ์ และพิมพ์เผยแพร่แล้ว 10 ชนิด ยังมีไลเคนที่คาดว่าจะสายพันธุ์ใหม่อีกประมาณ 110 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของสายพันธุ์ที่พบทั้งหมด นอกจากนี้กว่าร้อยละ 50 ของสายพันธุ์ที่สำรวจพบ (244 ชนิด) ในครั้งนี้ ยังเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในประเทศไทย แสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในประเทศไทยยังต้องมีการสำรวจและศึกษาอีกมาก ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลทรัพยากรชีวภาพกลุ่มนี้ที่สมบูรณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



รจํานกไลเคน

อนุกรมวิธานของไลเคนมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ การจัดจำแนกไลเคนเป็นวงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) ในรายงานนี้ใช้หลักการที่พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ วารสาร และเอกสารทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการไลเคนในระดับนานาชาติ โดยได้ใช้วิจารณ์จากผู้ศึกษาประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น หนังสือและคู่มือที่ใช้ในการจำแนกไลเคนในวงศ์ต่างๆ มีดังนี้

■ **มหไลเคน (macrolichens) พวงโฟลีโอส (foliose)
พวทูโคส (fruticose) และสแควมูโลส (squamulose)
และจุลไลเคน (microlichens) พวงครัสโตส (crustose)**

- วงศ์ Bacidiaceae : Awasthi, 1991; Roger, 1992 และ Thower, 1998
- วงศ์ Cladoniaceae : Archer, 1992 และ Ahti, 2000
- วงศ์ Coccocarpiaceae : Arvidsson, 1982 และ Awasthi, 1988
- วงศ์ Collembataceae : Awasthi, 1988 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ Ectolechiaceae : Roger, 1992
- วงศ์ Fuscideaceae : Awasthi, 1991; Roger, 1992 และ Malcolm and Galloway, 1997
- วงศ์ Graphidaceae : Archer, 2000; Nakanishi, 1966 และ Wirth and Hale, 1978
- วงศ์ Gyalectaceae : Awasthi, 1991
- วงศ์ Haematommataceae : Awasthi, 1991
- วงศ์ Hymeneliaceae : Thower, 1998
- วงศ์ Lecanoraceae : Purvis and *et al.*, 1992; Roger, 1992 และ Malcolm and Galloway, 1997
- วงศ์ Lecideaceae : Roger, 1992
- วงศ์ Letroultiaceae : Awasthi, 1991
- วงศ์ Lobariaceae : Awasthi, 1988; Galloway, 2001; Joshi and Awasthi, 1982 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ Megalosporaceae : Roger, 1992

- วงศ์ **Parmeliaceae** : Awasthi, 1988; Elix, 1994; Hale, 1975a; Hale, 1975b; Hale, 1976a; Hale, 1976b; Hale, 1976c; Singh and Sinha, 1993 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ **Pannariaceae** : Awasthi, 1988; Jørgensen and Galloway, 1992 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ **Pertusariaceae** : Awasthi, 1991 และ Roger, 1992
- วงศ์ **Physciaceae** : Coppins, 1983; Elix, 1994; Hale, 1983; Mayrhofer, 1983; Moberg, 1983; Roger, 1992 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ **Pilocarpaceae** : Roger, 1992
- วงศ์ **Pyrenulaceae** : Awasthi, 1991; Harris, 1995 และ Roger, 1992
- วงศ์ **Ramalinaceae** : Awasthi, 1988; Stevens, 1987 และ Swinscow and Krog, 1988
- วงศ์ **Thelotremaaceae** : Hale, 1974; Hale, 1978; Hale, 1981; Lumbsch, 1989; Nagarkar, Sethy and Patwardhan, 1988 และ Purvis and Jørgensen, 1995
- วงศ์ **Trapeliaceae** : Roger, 1992
- วงศ์ **Trypetheliaceae** : Awasthi, 1991; Harris, 1984; Harris 1991; Harris 1995; Harris 1998; Makhija and Patwardhan, 1988 และ Makhija and Patwardhan 1993
- วงศ์ **Usneaceae** : Awasthi, 1988; Stevens, 1999 และ Swinscow and Krog, 1988

การวิเคราะห์ชื่อวิทยาศาสตร์ของไลเคน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสกุล (genus) และชนิด (species) ในที่นี้เริ่มจากการวิเคราะห์วงศ์ (family) ของไลเคนก่อน หลังจากนั้นจึงใช้คู่มือของแต่ละวงศ์ นำไปสู่สกุล และชนิด

คู่มือ (key) ในการจำแนกวงศ์ (family) ของไลเคนต่อไปนี้ รวมไลเคน ขนาดใหญ่ (macrolichens) ซึ่งได้แก่ ไลเคนพวกฟรุติโกส (แพลตัสเป็นพุ่ม หรือ เส้นสาย) พวกโฟลิโอส (แพลตัสเป็นแผ่นใบบางๆ) พวกเกล็ดใบ (squamulose) และครัสโตส (crustose) ไลเคนจากเรือนยอด (canopy lichens) ใช้คู่มือการจำแนก ในกลุ่มนี้เช่นกัน

การจำแนกไลเคนบนใบไม้ ใช้คู่มือที่แตกต่างจากไลเคนกลุ่มอื่น (ดูหน้า 53 ถึง 60)

■ **คู่มือจำแนกวงศ์ของไลเคนพวกฟรุติโคส โพลีโอส
สแควมูลอส และครัสโตส (key to families of fruticose,
foliose, squamulose and crustose lichens)**

- 1ก. โครงสร้างเทลลีสมีลักษณะลำต้นเป็นพุ่ม หรือเส้นสาย (fruticose) เกาะที่
อยู่อาศัยด้วยโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า โฮลด์ฟาสท์ (hold fast) 2
- 1ข. โครงสร้างเทลลีสมีลักษณะเป็นแผ่นใบ แบบราบ (foliose) หรือติดแน่น
กับที่อยู่อาศัย (crustose) หรือมีลักษณะเป็นเกล็ด (squamulose) 3
- 2ก. เทลลีสเป็นพุ่ม หรือเส้นสาย กทม มีแกนกลาง (axis) แบบกลวง หรือ
ตัน Usneaceae
- 2ข. เทลลีสเป็นพุ่ม หรือเส้นสาย เส้นแบน หรือโป่งพอง ไม่มีแกนกลาง
(axis) Ramalinaceae
- 3ก. เทลลีสประกอบด้วยโครงสร้าง 2 แบบ คือ ส่วนที่เป็นเกล็ดเล็กๆ กับส่วน
ที่ค้ำหรงคล้ายลำต้น (podetia) เทือกยูเอโทเทซิยม หรือเกล็ด Cladoniaceae
- 3ข. เทลลีสมีลักษณะเป็นแผ่นใบ แบบราบ หรือแบบพุ่มผกติดแน่นกับที่อยู่
อาศัย 4
- 4ก. เทลลีสแบบแผ่นใบ 5
- 4ข. เทลลีสแบบพุ่มผก (crustose) ติดแน่นกับที่อยู่อาศัย 10
- 5ก. แผ่นเทลลีสไม่แบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจน (homoiomorous) ... Collemataceae
- 5ข. แผ่นเทลลีสแบ่งเป็นชั้นของรา และสาหร่ายอย่างชัดเจน (heteromorous) 6
- 6ก. มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ 7
- 6ข. มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ 8
- 7ก. แอสโคสปอร์สีเข้ม (สีน้ำตาล-ดำ) พบตั้งแต่ 2-3 เซลล์
(1-2 มั่นกัน) Physciaceae
- 7ข. แอสโคสปอร์สี 1 เซลล์ (simple) Parmeliaceae
- 8ก. ไม่มีผิวเทลลีสด้านล่าง เห็นเส้นใยชั้นเคลือบชัดเจน Pannariaceae
- 8ข. ผิวเทลลีสด้านล่างพัฒนาเป็นชั้นอย่างชัดเจน 9
- 9ก. หน้างานสีน้ำตาล ขอบกลมยกขึ้นรูปจาน ผิวเทลลีสด้านล่าง มีไซฟีเล
(cyphellae) หรือเส้นที่นูนขึ้นเป็นร่างแห (vein) Lobariaceae
- 9ข. แอโพเทซิยมหน้างานสีส้ม ขอบไม่สมมาตร รวนชิดกับเทลลีส โอบมีสัน
นูน ขึ้นในแนวรัศมี (concentric ridge) Coccocarpiaceae
- 10ก. โครงสร้างสืบพันธุ์แบบ ไลเรลเลทแอโพเทซิโย
(lirellate apothecia) Graphidaceae
- 10ข. โครงสร้างสืบพันธุ์แบบ เพอริเทซิยม (perithecium) หรือแอโพเทซิโย
แบบจาน (disc apothecia) 11
- 11ก. โครงสร้างสืบพันธุ์แบบเพอริเทซิยม 12
- 11ข. โครงสร้างสืบพันธุ์แอโพเทซิโยแบบจาน 14

12ก.	โครงสร้างสืบพันธุ์แบบ เพอริทีเซียม เปิดด้านบน ..	Thelotremaaceae
12ข.	โครงสร้างสืบพันธุ์แบบ เพอริทีเซียม ปิดโดยมีช่องเปิด (ostiole).....	13
13ก.	แอสโคสปอร์สีเข้ม (สีน้ำตาล-ดำ)	Pyrenulaceae
13ข.	แอสโคสปอร์สีใส (hyaline)	Trypetheliaceae
14ก.	แอสโคเทียมแบบจานจมตัวในเทลลัส	Hymeneliaceae
14ข.	แอสโคเทียมแบบจานยกตัวขึ้นเหนือเทลลัส	15
15ก.	แอสโคสปอร์สีเข้ม (สีน้ำตาล-ดำ) พบตั้งแต่ 2 -3 เซลล์ (1-2 คนึงกัน)	Physciaceae
15ข.	แอสโคสปอร์สีใส (hyaline)	16
16ก.	แอสโคเทียมแบบลิจิไดอัน	17
16ข.	แอสโคเทียมแบบไบอะโพเทรียม (biatorine apothecium) หรือแอสโคเทียม แบบเลคานอรีน (lecanorine apothecium)	19
17ก.	พาราไฟซิสแบบเดี่ยว (simple)	18
17ข.	พาราไฟซิสเชื่อมเป็นร่างแห (anastomose)	Ectolechiaceae
18ก.	แอสโคสปอร์แบบกระสวย (fusiform)	Pilocarpaceae
18ข.	แอสโคสปอร์แบบทรงรี (ellipsoid)	Lecideaceae
19ก.	แอสโคเทียมแบบเลคานอรีน	20
19ข.	แอสโคเทียมแบบไบอะโพเทรียม	23
20ก.	แอสโคสปอร์จำนวนมากในหนึ่งแอสคัส	Fuscideaceae
20ข.	แอสโคสปอร์ 1-32 แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส	21
21ก.	แอสโคสปอร์รูปเส้น (filiform)	Haematommataceae
21ข.	แอสโคสปอร์ทรงรี (ellipsoid)	22
22ก.	แอสโคสปอร์ขนาดใหญ่กว่า 30 ไมโครเมตร	Pertusariaceae
22ข.	แอสโคสปอร์ขนาดเล็กกว่า 30 ไมโครเมตร	Lecanoraceae
23ก.	แอสโคสปอร์แบบ 1-เซลล์ (simple)	Trapeliaceae
23ข.	แอสโคสปอร์มากกว่า 1-เซลล์	24
24ก.	พาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยว (simple) ปลายบวมเป็นกระเปาะ (swollen apex)	Gyalectaceae
24ข.	พาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยว (simple) ปลายขรรคนา หรือปลายแตกรูปส้อม (fork-type)	25
25ก.	พาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยวปลายแตกรูปส้อม	Megalosporaceae
25ข.	พาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยวปลายขรรคนา	26
26ก.	ทดสอบสีแอสโคเทียม ให้สี K+ ม่วงแดง	Letrovitiaceae
26ข.	ทดสอบสีแอสโคเทียม ให้สี K-	Bacidiaceae

ตารางที่ 7 สรุปลักษณะสำคัญของวงศ์ (family) ของไลเคนพวกฟรุติโคส (fruticose) โฟลิโอส (foliose) แสควมูโลส (squamulose) และครัสโตส (crustose) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 22 วงศ์ โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของแทลลัส บางวงศ์มีแทลลัสมากกว่าหนึ่งแบบ

วงศ์ (family)	แอโพเทียเซีย (apothecia)	แอสโคสปอร์ (ascospores)	อื่นๆ
ฟรุติโคส (fruticose)			
Ramalinaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกลาโนวีน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบหนึ่งเซลล์	แทลลัสแบบเสาเทอไรโมริส ไนเทอริคัม แทลลัสแบบ
Usneaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกลาโนวีน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบ 1-4 เซลล์	แทลลัสแบบเสาเทอไรโมริส ไนเทอริคัม แทลลัสกลม
Cladoniaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกจิคิฮิน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบ 1-4 เซลล์	แทลลัสประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกล็ด (squamule) กับส่วนที่ตั้งตรงคล้ายด้าฟัน (digitose) เพื่อรูปแอโพเทียเซีย หรือเกล็ด
โฟลิโอส (foliose)			
Coccocarpicaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกจิคิฮิน แผ่นจานยื่นถึงยี่ง่า	สี่ใบ รูปกระสวย แบบ 1-เซลล์	สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน แทลลัสเป็นริ้วในแกนริคัม (concentric ridge)
Collemaaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกลาโนวีน	สี่ใบ รูปเข็ม แบบหลายเซลล์ ทรงแฉก หรือแบบ 1-เซลล์ รูปกระสวย หรือแบบ จัมนูริฟอร์ม	แทลลัสแบบ โสมโมริส เมื่อแห้งเมื่อรดน้ำคล้ายเกิดตุ่มพอง เมื่อเปียกกลับคล้ายหิน
Lobariaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกจิคิฮิน	สี่ใบ รูปกระสวย แบบ 1-4 เซลล์	ผิวแทลลัสด้านล่าง มีไซฟิอิดหรือสันที่งูขึ้นเป็นร่างแหคล้ายเส้นใย
Parmariaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกจิคิฮิน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบ 1-4 เซลล์	มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ ผิวแทลลัสด้านล่างไม่พัฒนา เส้นใยไซฟิอิดสาขาค่อนข้าง
Parmeliaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกลาโนวีน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบ 1-4 เซลล์	มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ โสมขนาดเล็กละเอียดขนาดใหญ่
Physciaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกลาโนวีน และ เกจิคิฮิน	สามเหลี่ยมถึงด้า ทรงแฉก แบบ 1-2 เซลล์	มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ พบโสมขนาดเล็ก
แสควมูโลส (squamulose)			
Cladoniaceae	แอโพเทียเซียแบบจานชนิด เกจิคิฮิน	สี่ใบ ทรงแฉก แบบ 1-4 เซลล์	แทลลัสประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกล็ด (squamule) กับส่วนที่ตั้งตรงคล้ายด้าฟัน (digitose) เพื่อรูปแอโพเทียเซีย หรือเกล็ด

ตารางที่ 7 สรุปลักษณะสำคัญของวงศ์ (family) ของไลเคนพวกฟรุติโคส (fruticose) โฟลิโอส (foliose) แสควมูโลส (squamulose) และครัสโตส (crustose) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 22 วงศ์ โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของเทอริสต์ บางวงศ์มีเทอริสต์มากกว่าหนึ่งแบบ (ต่อ)

วงศ์ (family)	แอโพเทียเซีย (apothecia)	แอสโคสปอร์ (ascospores)	อื่นๆ
Parmariaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ชนิดอะพิจิตีเชีย	สีใส ทรงรี แบบ 1-เซลล์	มีสphaerotrichia แทนน้ำเงินเป็นส่วนประกอบ ผิวเทอริสต์สีน้ำตาลไหม้พัฒนา เห็นเส้นใยชั้นเคลือบชัดเจน
ครัสโตส (crustose)			
Bacidiaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบสีอ่อนหรือเข้มกว่า แผ่นจานชนิดใบอะโพรีน แผ่นจานสีฟ้าเขียว น้ำตาลเข้ม และ/หรือสีดำ	สีใส ทรงกระบอก รูปกระสวย ทรงรี แบบ 2-เซลล์ หรือหลายเซลล์	
Fuscidiaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบสีเดียวกับเทอริสต์ ชนิดเลกาโนรีน แผ่นจานสีน้ำตาลแดง หรือน้ำตาลอมชมพู	สีใส ทรงรี แบบ 1-เซลล์	บางชนิดผิวเทอริสต์มีไฮซีเดีย ขึ้นตาม
Graphidaceae	แอโพเทียเซียแบบไฮเรเธส	สีใสหรือน้ำตาล ทรงรี หรือทรงรีแบน แบบหลายเซลล์ หรือยูริฟอร์ม และ จันยูริฟอร์ม	พาราไฟจิตีเชียเดี่ยว
Gyalactaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบสีอ่อนหรือเข้มกว่า ชนิดใบอะโพรีน แผ่นจานสีเทาถึงส้มขอบขาว	สีใส ทรงรี แบบ 1-คั่นกัน	ชั้นไฮเมเนียมเป็นเส้นพาราไฟจิตีเชียปลายทอนเป็นกระเปาะ
Haematomastaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบสีเดียวกับเทอริสต์ ชนิดเลกาโนรีน แผ่นจานสีเทาถึงสีเข้มน้ำตาล โฟลีส K+ บานแดง	สีใส รูปกระสวย แบบหลายเซลล์	ผิวเทอริสต์เป็นเม็ดกลมแบน แครกแตก
Hymeneliaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบไม่คั่นชัดเจน ชนิดเลกาโนรีน แผ่นจานบนผิวเทอริสต์ ถึงครึ่งถึงสองออกขึ้น	สีใส ทรงรี ไม่มีคั่นกันตามขวาง	ส่วนใหญ่ขึ้นบนหิน

ตารางที่ 7 สรุปลักษณะสำคัญของวงศ์ (family) ของไลเคนพวกฟรุติโคส (fruticose) โฟลีโอส (foliose) แสควมูโลส (squamulose) และครัสโตส (crustose) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 22 วงศ์ โดยแบ่งกลุ่มตามลักษณะของเทลีสต์ บางวงศ์มีเทลีสต์มากกว่าหนึ่งแบบ (ต่อ)

วงศ์ (family)	แอโพเทียเซีย (apothecia)	แอสโคสปอร์ (ascospores)	อื่นๆ
Lecanoraceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบสีหรือวับเทลีสต์ ชนิดผลึกไวนิน แผ่นจานสีฟางข้าว หรือน้ำตาลแดงเข้ม ถึงสีน้ำตาลเกือบดำ	สีใส ทรงรี แบบมีผนังกัน ลามขวางชั้นเดียว	ปลอกไทรูส (ปลอกถุงสปอร์) เป็นรูปขอบขนานยาวได้สี 1+
Lecroutiaceae		สีใส ทรงรี แบบมีผนังกัน ลามขวางหลายชั้น ถึงแบบนิวรีฟอร์ม	แอโพเทียเซียแบบจานขอบหนา สีเหลืองถึงเข้ม ชนิดโอะอะ ไทโรน แผ่นจานสีน้ำตาลแดงถึง น้ำตาลเข้มเกือบดำ
Megalosporaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน	สีใส ทรงรี แบบมีผนังกัน ลามขวางแบบหลายซอกซ์	ขอบขาวชนิดโอะ ไทโรน แผ่นจานสีดำ
Pilocarpaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบหนาสีเดียวกับ เทลีสต์ชนิดเอซิดิอัม ขอบหนาสีเดียวกับ เทลีสต์ แผ่นจานสีดำ	สีใส รูปกระสวย แบบมีผนังกันลามขวาง หลายผนัง	เทลีสต์มีเส้นใยสีขาวปกคลุม
Physciaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ชนิดผลึกไวนิน และ เอซิดิอัม	สีน้ำตาลถึงดำ ทรงรี แบบ 1-2 ผนังชั้น	มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ
Pyrenulaceae	เพอร์ริเซียแบบเปลือก มีช่องเปิด (ostiole)	สีน้ำตาล ทรงรี และแบบหลายซอกซ์	
Thelotremonaceae	เพอร์ริเซียแบบแบบ เปลือกหนา	สีใสถึงสีน้ำตาล ทรงรี แบบนิวรีฟอร์ม และ แบบหลายซอกซ์	เพอร์ริเซียแบบมี หรือกิ่งฝังใน เทลีสต์
Trapeliaceae	แอโพเทียเซียแบบจาน ขอบขาวถึงดำ ชนิด โอะอะ ไทโรน แผ่นจาน สีฟางข้าว ถึงสีน้ำตาลเกือบดำ	สีใส ทรงรีถึงทรงรีขอบ ยื่นแบบไม่มีผนังกันลาม ขวาง	เทลีสต์มีผิวแบบเรียบ แยกยาว มีาจิเวชั่น หรือมีกึ่งกึ่งอื่นๆ
Trypetheliaceae	เพอร์ริเซียแบบเปลือก มีช่องเปิด (ostiole)	สีใส ทรงรี แบบนิวรีฟอร์ม และแบบหลายซอกซ์	สร้างเนื้อเยื่อตามสโครมา เชื่อมกลุ่มเพอร์ริเซีย

■ ไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens)

ไลเคนบนใบไม้ จำนวนโคโดใช้ลักษณะ โครงสร้างของเทอลัสและแอปอเทций แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีหนังสือเล่มนี้ที่ใช้นในการจำแนกเป็นวงศ์ ดังนี้

1. ไลเคนบนใบไม้ที่มีเทอลัสแบบโฟลีโอส

ประกอบด้วย

- 1.1 วงศ์ *Collemataceae*: Aptroot and Seaward, 1999.
- 1.2 วงศ์ *Parmeliaceae*: Sérusiaux, 1984c; Elix, 1994.
- 1.3 วงศ์ *Physciaceae*: Aptroot *et al.*, 1995; Lücking, 1998a.

2. ไลเคนบนใบไม้ที่มีเพอริทีเซีย

ประกอบด้วย

- 2.1 วงศ์ *Strigulaceae*: Boonpragob *et al.*, 1998; Lücking, 1999b; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1997a; Sérusiaux, 1998a; Sérusiaux and Polty, 1996; Wilde-Duyfjes, 1967; Farkas and Sipman, 1993; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Ricci and Tomaselli, 1958; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Aptroot *et al.*, 1995; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sathy and Patwardhan, 1987; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997; Bricaud and Roux, 2000; Lücking, 1995d; Foucault *et al.*, 1982.

- 2.2 วงศ์ *Trichotheliaceae*: Boonpragob *et al.*, 1998; Busse and Dickinson, 1991; Harada, 1994; Lücking, 1996b; Lücking, 1998c; Lücking, 1999c; Lücking and Ferraro, 1997; Lücking and Vézda, 1998; Lücking and Cáceres, 1999; Lücking *et al.*, 2000; Malcolm *et al.*, 1995; Makhija *et al.*, 1994; McCarthy, 1997; Reynolds, 1982; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1991; Singh, 1961; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g;

Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1984a; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1989b; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997; Aptroot and Sipman, 1989; Bricaud and Roux, 2000; Lücking, 1995d; Foucault *et al.*, 1982; Sérusiaux, 1979b; Malcolm and Vézda, 1995b.

3. ไลเคนบนใบไม้แบบครัสโตสที่มีเนื้อโพที่เชื่อมแบบไลเรเลท

3.1 วงศ์ **Opegraphaceae**: Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Ricci and Tomaselli, 1958; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Aptroot and Sipman, 1991; Aptroot *et al.*, 1995; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Sérusiaux, 1984a; Vézda, 1974; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Vézda, 1979; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Sérusiaux, 1985; Singh, 1969; Bricaud and Roux, 2000; Lücking, 1995d.

3.2 วงศ์ **Graphidaceae**: Aptroot and Seaward, 1999; Lücking *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1970; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1997; Awasthi and Singh, 1973.

4. ไลเคนแบบครัสโตสบนใบไม้ที่มีเนื้อโพที่เชื่อมถึงผิวงหรือโผล่เหนือทอลัส

4.1 วงศ์ **Gomphillaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Hartmann, 1996; Hawksworth, 1972; Lücking, 1997c; Lücking, 1998b; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1984b; Sérusiaux, 1989a; Sérusiaux, 1998c; Vézda, 1994; Vézda and Malcolm, 1997; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking,

1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Vézda, 1979; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1975a; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997.

4.2 𑖦𑖦𑖦 **Opegraphaceae**: Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Ricci and Tomaselli, 1958; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Aptroot and Sipman, 1991; Aptroot *et al.*, 1995; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Sérusiaux, 1984a; Vézda, 1974; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Vézda, 1979; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Sérusiaux, 1985; Singh, 1969; Bricaud and Roux, 2000; Lücking, 1995d.

4.3 𑖦𑖦𑖦 **Thelotremaaceae**: Hale, 1975; Lücking *et al.*, 2000; Lumbsch *et al.*, 1997; Santesson, 1952; Singh, 1970; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Malcolm and Galloway, 1997; Sammy, 1980; Sethy and Patwardhan, 1987; Malcolm and Galloway, 1997.

5. ไลเคนแบบคริสต์โคสบนใบไม้ที่มีเนื้อโพที่เชื่อมแบบราบคล้ายจุด

5.1 วงศ์ **Arthoniaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Ferraro and Lücking, 1997; Lücking *et al.*, 2000; Makhija and Patwardhan, 1995; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1992; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Ricci and Tomaselli, 1958; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Aptroot and Sipman, 1991; Aptroot *et al.*, 1995; Lücking, 1995c; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000.

5.2 วงศ์ **Pilocarpaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Cáceres, 1999b; Elix *et al.*, 1995; Ferraro and Lücking, 1999; Lücking, 1997b; Lücking *et al.*, 1994; Lücking *et al.*, 2000; Lücking *et al.*, 2001; Lücking and Santesson, 2001; Malcolm and Vézda, 1995a; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1996; Sérusiaux, 1998b; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995c; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Sérusiaux, 1984a; Vézda, 1974; Vézda, 1986; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Samy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sathy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997; Cáceres and Lücking, 2000; Vézda and Hafellner, 1991; Foucault *et al.*, 1982; Sérusiaux, 1979b; Bricaud and Roux, 2000.

5.3 วงศ์ **Gomphillaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Hartmann, 1996; Hawksworth, 1972; Lücking, 1997c; Lücking, 1998b; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1984b; Sérusiaux, 1989a; Sérusiaux, 1998c; Vézda, 1994; Vézda and Malcolm, 1997; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking,

1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Vézda, 1979; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1975a; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997.

6. ไลเคนแบบคริสต์ศาสนไปไม้ที่มีเนื้อโหนกที่เชื่อมแบบจาน

6.1 วงศ์ **Gomphillaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Hartmann, 1996; Hawksworth, 1972; Lücking, 1997c; Lücking, 1998b; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1984b; Sérusiaux, 1989a; Sérusiaux, 1998c; Vézda, 1994; Vézda and Malcolm, 1997; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1975b; Vézda, 1973; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seaward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Vézda, 1979; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1975a; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997.

6.2 วงศ์ **Gyalectaceae**: Boonpragob *et al.*, 1998; Chung, 1995; Lücking, 1999d; Lücking and Kalb, 2000; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Vézda and Farkas, 1988; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Lücking, 1997e; Ricci and Tomaselli, 1958; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Vézda, 1974; Aptroot and Sipman, 1993; Malcolm and Galloway, 1997; Sammy, 1980; Vézda and Kalb, 1991; Malcolm and Galloway, 1997; Cáceres and Lücking, 2000; Vézda and Lücking, 1995; Vézda and Hafellner, 1991; Aptroot and Sipman, 1989.

6.3 วงศ์ *Ectolechiaceae*: Boonpragob *et al.*, 1998; Elix *et al.*, 1992; Elix *et al.*, 1995; Lücking *et al.*, 2000; Lücking and Sérusiaux, 2001; Malcolm and Vézda, 1994; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1986; Sérusiaux, 1997b; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Vézda, 1980; Sérusiaux, 1978; Sérusiaux, 1984a; Vézda, 1984; Vézda, 1974; Vézda, 1986; Lücking, 1999a; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997.

6.4 วงศ์ *Pilocarpaceae*: Boonpragob *et al.*, 1998; Cáceres, 1999b; Elix *et al.*, 1995; Ferraro and Lücking, 1999; Lücking, 1997b; Lücking *et al.*, 1994; Lücking *et al.*, 2000; Lücking *et al.*, 2001; Lücking and Santesson, 2001; Malcolm and Vézda, 1995a; Santesson, 1952; Sérusiaux, 1996; Sérusiaux, 1998b; Farkas, 1986; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Vézda *et al.*, 1997; Sipman, 1991a; Lücking, 1995e; Lücking, 1997e; Santesson and Lücking, 1999; Vézda, 1984; Sipman, 1991b; Vézda, 1977; Sipman, 1997; Lücking, 1997d; Aptroot and Seward, 1999; Lücking, 1998a; Lücking, 1999g; Lücking, 1999e; Lücking, 1999d; Lücking and Lücking, 1995; Lücking, 1999f; Lücking, 1992a; Lücking, 1992b; Lücking, 1997f; Lücking, 1997a; Lücking, 1991; Lücking *et al.*, 2001; Lücking, 1995a; Lücking, 1995b; Lücking, 1995f; Sérusiaux, 1995; Thor *et al.*, 2000; Sérusiaux, 1978; Sérusiaux, 1984a; Vézda, 1974; Vézda, 1986; Aptroot and Sipman, 1993; Awasthi and Singh, 1973; Malcolm and Galloway, 1997; Sammy, 1980; Sérusiaux, 1984a; Sérusiaux, 1979a; Sérusiaux, 1989b; Sethy and Patwardhan, 1987; Vézda and Kalb, 1991; Vézda, 1983; Malcolm and Galloway, 1997; Cáceres and Lücking, 2000; Vézda and Hafellner, 1991; Foucault *et al.*, 1982; Sérusiaux, 1979b; Bricaud and Roux, 2000.

6.5 วงศ์ *Lecanoraceae*: Kalb, *et al.*, 2000; Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Vézda and Farkas, 1988; Lücking and Lücking, 1995.

7. ไลเคนแบบคริสต์ศตวรรษใบไม้ที่มีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบพิกนินเดีย

7.1 วงศ์ *Monoblastiaceae*: Lücking *et al.*, 2000; Santesson, 1952; Farkas and Sipman, 1993; Farkas and Sipman, 1997; Lücking, 1998a; Lücking *et al.*, 2001.

ตารางที่ 8 สรุปลักษณะสำคัญของวงศ์ (family) ของไลเคนบนใบไม้ (foliicolous) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วงศ์ (family)	แอโพเทียเซีย (apothecia)	แอสโคสปอร์ (ascospores)	อื่นๆ
โฟลลิโคส (foliose)			
Collemaaceae	ไม่พบ	ไม่พบ	สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) เกือบถึงสิบหกชิ้น เกือบดำ
Parmeliaceae	ไม่พบ	ไม่พบ	สีเขียวค่อนข้างเทา ขอบแอตริส พบบนเซดจ์ (เป็นกรรปเต)
Physciaceae	ไม่พบ	ไม่พบ	แอตริสสีเทาอมเขียว ขอบแอตริสไม่พบบนเซดจ์
ครัสโตส (crustose)			
Arthoniaceae	แบบราบคล้ายจุด สีเข้มน้ำตาล น้ำตาลเข้ม และสีดำ อาจมีนาริชาว หรือสีส้มกุดของแอโพเทียเซีย	รูปไข่รี มีผนังตามขวาง 2 ชั้น เซดจ์ระบุว่า เซดจ์สั้น	
Elcotechiaceae	แบบจานลึกเหลือง สด น้ำตาล ดำ อยู่เหนือแอตริส	สีน้ำตาลรูปรีหรือทรงกระบอก หรือรูปกระสวยปลายมน	พบแอตริสสีเทา (ครึ่งฤดูหนาว) เป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ แคนโฟลลิโค-สปอร์ รูปวงต่างๆ กัน รูปเส้นโค้ง มีผนังตามขวาง ไม่แตกกิ่งหรือแตกกิ่ง และรูปของน้ำ
Gomphiliaceae	แบบจานกึ่งฝัง	รูปค่อนข้างกลม สีใส มีผนังตามขวาง 3-24 ชั้น รูปกระบอก และแบบรูปรี	ถุงสปอร์มีผนังสองชั้น พาราไฟซิสแตกกิ่งมากจนเชื่อมกันเป็นร่างแห มีไฮโฟฟอริเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์ แบบไม่อาศัยเพศ
Graphidaceae	แบบไฮเรตเตค สีน้ำตาลอ่อน ถึงดำ	รูปกลมรี ไข่รีน้ำเงินกับไฮโดฟิน	พาราไฟซิสไม่แตกกิ่งจนถึงเชื่อมกันเป็นร่างแห
Gyalactaceae	แบบจานลึกเหลือง ถึงส้ม	รูปค่อนข้างกลมมีผนังตามขวาง 1 ชั้น	แอตริส 2 แบบ เป็นไฮสากับหลอดๆ และแบบครัสโตส พาราไฟซิสไม่แตกกิ่ง ถุงสปอร์ทรงกระบอกยาว ไม่ไข่รี 1-
Lecanoraceae	แบบจานลึกเหลืองอ่อน ตรงกลางนูน	รูปเข็มหรือเส้นโค้ง สีใส มีผนังตามขวาง 3-7 ชั้น	พาราไฟซิสไม่แตกกิ่ง ถุงสปอร์ไข่รี 1-
Monoblastiaceae	ไม่พบ	ไม่พบ	ครัสโตส คล้ายเส้นใย พบในพืชคล้ายเส้นใย สีดำ ยาว 0.5-1.0 เซนติเมตร โคนีเดีย รูปไข่ สีใส พบที่ขอบโคนีเดีย

ตารางที่ 8 สรุปลักษณะสำคัญของวงศ์ (family) ของไลเคนบนใบไม้ (foliicolous) ที่พบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ต่อ)

วงศ์ (family)	แอโพเทเกียเซีย (apothecia)	แอสโกสปอร์ (ascospores)	อื่นๆ
Opegraphaceae	แบบโลเวลล มีเข็ม กิ่งไม้	รูปกระสวย เซลล์ยาว กลาง ใหญ่กว่าเซลล์อื่น มีผนังชั้น	เอกจิฐิลัมฟิลิเคาติ่ ดูงุ้มสปอร์ รูปกระบอก (Anthraciaceae ดูงุ้มสปอร์รูปไข่)
Pilocarpaceae	แบบจานหรือ แบบรวมกันด้วยจุด	รูปแผ่น หรือกระสวย มีผนังชั้นสามขวาง 3-7 ชั้น	มีสมรเทศที่หลบใบไม้เก่าแก่ที่สุด
Strigulaceae	เทอริฟิเจียนเดี่ยว	รูปกระสวย มีผนังชั้นสาม ขวาง 1 ชั้น	พบโครงสร้างเส้นพันธุ์แบบ ฟักนิลสี
Thelethremataceae	มีงมใบแบบกลีบ สี่เหลี่ยมคางหมู ถึง สี่เหลี่ยมคางหมู บางครั้ง ขอบเขตโพธิ์เจียนโพธิ์ บนใบหรือกิ่ง (คล้ายกับ ดอกไม้)	รูปแผ่น มีผนังชั้นสามขวาง หรือแบบรูปสี่เหลี่ยม	พบสกุลเดียว Chroodiscus พาราไฟซีตที่ไม่แตกกิ่ง มีผนังชั้นเจียนกว้างมาก
Trichotheliaceae	เทอริฟิเจียนเดี่ยวหรือ เดี่ยวคางหมู กิ่งไม้	รูปกระสวย มีผนังชั้นสาม ขวาง 3-7 ชั้น	ดูงุ้มสปอร์มีผนังชั้นเดียว

บรรณานุกรม/Bibliography

■ มหไลเคน (macrolichens) และจุลไลเคน (microlichens)

- Archer, A. W. 1992. Cladoniaceae. **Flora of Australia** 54: 246–293.
- Archer, A. W. 2000. The lichen genera *Phaeographis* and *Phaeographina* (Graphidaceae) in Australia 1: Species based on Australian type specimens. **Telopea** 8 (4): 461–475.
- Ahti, T. 2000. Cladoniaceae. **Flora Neotropica Monograph** 78. The New York Botanical Garden. New York.
- Arvidsson, L. 1982. A monograph of the genus *Coccocarpia*. **Opera Botanica** 67: 1–96.
- Awasthi, D. D. 1988. A key to the Macrolichens of India and Nepal. **The Journal of the Hattori Botanical Laboratory** 65: 207–302.
- Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. **Bibliotheca Lichenologica** 40: 1 – 360.
- Coppins, B. J. 1983. A New Corticolous Soridiate *Rinodina* from Swedish Lapland. **Lichenologist** 15: 147–150.
- Elix, J.A. 1994 . Parmeliaceae, Key to Genera in **Flora of Australia** 55: 5–6.
- Galloway, D. J. 2001. Lobariaceae. **Flora of Australia** 58 A: 37–101.
- Hale, M. E. 1974. Modern-Smithsonian expedition to Dominica: The lichens (*Thelotrema*aceae). **Smithsonian Contributions Botany** 16: 1–46.
- Hale, M. E. 1975a. A monograph of the lichen genus *Relicina* (Parmeliaceae). **Smithsonian Contributions Botany** 26: 1–32.
- Hale, M. E. 1975b. A monograph of the lichen genus *Hypotrachyna* (Parmeliaceae) in tropical America. **Smithsonian Contributions Botany** 25: 1–73.
- Hale, M. E. 1976a. A monograph of the lichen genus *Bulbothrix* Hale (Parmeliaceae). **Smithsonian Contributions Botany** 32: 1–29.
- Hale, M. E. 1976b. A monograph of the lichen genus *Parmelina* Hale (Parmeliaceae). **Smithsonian Contributions Botany** 33: 1–60.
- Hale, M. E. 1976c. A monograph of the lichen genus *Pseudoparmelia* Lynge (Parmeliaceae). **Smithsonian Contributions Botany** 31: 1–62.
- Hale, M. E. 1978. A revision of the lichen family *Thelotrema*aceae in Panama. **Smithsonian Contributions Botany** 38: 1–60.

- Hale, M. E. 1981. A revision of the lichen family *Thelotrema* in Sri Lanka. **Bulletin of the British Museum (National History). Botany Series** 8: 227–332.
- Hale, M. E. 1983. Cortical Structure in *Physcia* and *Phaeophyscia*. **Lichenologist** 15: 157–160.
- Harris, R. C. 1984. The family Trypetheliaceae (Loculoascomycetes: lichenized Melanommatales) in Amazonian Brazil. **Acta Amazon., Manus** 14 (1–2): 55–80.
- . 1991. A reversion of *Polymeridium* (Müll. Arg.) R. C. Harris (Trypetheliaceae). **Boletim do Museu Paraense “Emílio Goeldi”, serie Botanica** 7: 619–644.
- . 1995. **More Florida lichens, Including The 10c Tour of the Pyrenolichens**. Published by the author, Bronx, New York.
- . 1998. A preliminary revision of *Pseudopyrenula* Müll. Arg. (Lichenized Ascomycetes, Trypetheliaceae) with a redistribution of the names previously assigned to the genus. **Lichenographia Thomsaniana: North America Lichenology in Honor of John W. Thomson**. 133–148.
- Joshi, M. and D. D. Awasthi. 1982. The lichen family Stictaceae in India and Nepal. **Biol. Mem.** 7 (2): 165–190.
- Jørgensen, P. M., and D. J. Galloway. 1992. Pannariaceae. **Flora of Australia** 54: 246–293.
- Lumbsch, H.T. 1989. Die Holarktischen Vertreter Der Flechtengattung *Diploschistes* (Thelotremaaceae). **The Journal of the Hattori Botanical Laboratory** 66: 133–196.
- Makhija, U., and P. G. Patwardhan. 1988a. The lichen genus *Laurera* (family Trypetheliaceae) in India. **Mycotaxon** 31: 565–590.
- . 1993. A contribution to our knowledge of the lichen genus *Trypethelium* (family Trypetheliaceae). **Journal of the Hattori Botanical Laboratory** 73: 183–219.
- Malcolm, W. M., and D. J. Galloway. 1997. **New Zealand lichen checklist, Key and Glossary**. Wellington: Museum of New Zealand, Te Papa Tongarewa.
- Mayrhofer, H. 1983. The Saxicolous Species of *Rinodina* in New Zealand. **Lichenologist** 15: 267–282.
- Moberg, R. 1983. Study on Physciaceae (Lichens) II. The Genus *Pyxine* in Europe. **Lichenologist** 15: 161–167.

- Nagarkar, M. B., Sethy, P. K. and Patwardhan, P. G. 1988. Lichen genus *Ocellularia* (family *Thelotrema*aceae) from India. **Biovigyanam** 14(1): 24–43.
- Nakanishi, M. 1966. Taxonomical Studies on the Family Graphidaceae of Japan. **Journal of Science of the Hiroshima University. Series B. Div. 2**, 11: 51–126.
- Purvis, O.W., B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. James and D. M. Moore. 1992. **The Lichen Flora of Great Britain and Ireland**. Natural History Museum London.
- Purvis, O. W., P. M. Jørgensen. 1995. The lichen genus *Thelotrema* Ach. In Europe. **Bibliotheca Lichenologica** 58: 335–360.
- Roger, R.W. 1992. Key to Australian Lichen Genera in **Flora of Australia Vol.54**: 1–349.
- Singh, K. P. and G.P. Sinha. 1993. Two new species of *Parmelina* from India. **Nordic Journal of Botany** 13 (4): 463–466.
- Stevens, G. N. 1987. The lichen genus *Ramalina* in Australia. **Bulletin of the British Museum (Natural History) Botany series** 16 (2): 107–223.
- Stevens, G. N. 1999. A revision of the lichen family Usneaceae in Australia. **Bibliotheca Lichenologica**. 72: 1–128.
- Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. **Macrolichens of East Africa**. British Museum London.
- Thrower, S. L. 1998. **Hong Kong Lichens**. Department of Biology, The Chinese University of Hong Kong : 61.
- Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). **Smithsonian Contributions Botany** 4: 1–46.

■ โไลเคนบนใบไม้ (foliicolous)

- Brusse, F. A. and C. H. Dickinson. 1991. A new foliicolous species in the lichen genus *Porina* (Porinaceae, Pyrenulaceae) from Southern Africa. **Mycotaxon** 62: 347–350.
- Cáceres, M. 1999. A new foliicolous *Byssoloma* (Lichenized ascomycetes: Pilocarpaceae) from the Atlantic rainforest in Pernambuco, Brazil. **Mycotaxon** 71: 383–386.
- Elix, J. A. and C. E. Crook. 1992. The chemistry of foliicolous lichens 1. Constituents of *Sporopodium vezdeanum* and *S. xantholeucum*. **Mycotaxon** 64 (2): 409–415.

- Elix, J. A., H. T. Lumbsch, and R. Lücking. 1995. The chemistry of foliicolous lichens 2. Constituents of some *Byssoloma* and *Sporopodium* species. In Farkas, E. E., R. Lücking, and V. Wirth. 1995. Scripta Lichenologica Lichenological Papers Dedicated to Antonin Vězda. **Bibliotheca Lichenologica** 58: 81–96.
- Ferraro, L. I. L. and R. Lücking. 1997. New species or interesting records of foliicolous lichens. III. *Arthonia crystallifera* spec. nov (Lichenized Ascomycetes: Arthoniaceae), with a world-wide key to the foliicolous Arthoniaceae. **Phyton: Annales Rei Botanicae**. 37 (1): 61–70.
- . 1999. New species or interesting records of foliicolous lichens. V. Two new species of *Fellhanera* (Lichenized Ascomycotina: Pilocarpaceae) with 1-septate ascospores. **Mycotaxon** 73: 163–167.
- Hale, M. E. 1975. Studies on the lichens family Thelotremaaceae. 3. **Mycotaxon** 3 (1): 173–181.
- Harada, H. 1994. *Trichothelium marianense*, a new foliicolous lichens species from the Mariana Islands, Micronesia. **The Bryologist** 97 (3): 272–274.
- Hartmann, C. 1996. Two new foliicolous species of *Calenia* (Lichens, Gomphillaceae) from Costa Rica. **Mycotaxon**. 59: 483–488.
- Hawksworth, D. L. 1972. A new species of *Tricharia* Fée em. R. Sant. from Hong Kong. **Lichenologist**. 5: 321–322.
- Lücking, R. 1996. Taxonomic studies in foliicolous species of the genus *Porina*. I. The *Porina rufula* aggregate. **Botanica Acta**. 109 (3): 248–260.
- . 1997a. Additions and corrections to the knowledge of the foliicolous lichen flora of Costa Rica. The genus *Fellhanera*, with notes on *Bacidia pauciseptata*. **Tropical Bryology**. 13: 141–173.
- . 1997b. Additions and Corrections to the knowledge of the foliicolous lichen flora of Costa Rica. The family Gomphillaceae. **Bibliotheca. Lichenologica**. 65: 1–105.
- . 1998. Additions and corrections to the knowledge of the foliicolous lichen flora of Costa Rica. The genus *Trichothelium* (Lichenized Ascomycetes: Trichotheliaceae). **Nova Hedwigia** 66 (3–4): 375–417.
- . 1999a. Additions and corrections to the knowledge of the foliicolous lichen flora of Costa Rica. The family Asterothyriaceae and the genus *Chroodiscus* (Thelotremaaceae), with a phylogenetic analysis. **Cryptogamic Mycology**. 20 (3):193–224.

- . 1999b. New species or interesting records of foliicolous lichens. IV. *Porina pseudoapplanata* (Lichenized ascomycetes: Trichotheliaceae), a remarkable new species with *Phyllophiale*-type isidia. **Lichenologist**. 31 (4): 349–358.
- . 1999c. Additions and corrections to the foliicolous lichen flora of Costa Rica. The family Gyalectaceae. **Lichenologist** 31 (4): 359–374.
- Lücking, R., H. T. Lumbsch, and J. A. Elix. 1994. Chemistry, Anatomy and Morphology of Foliicolous species of *Fellhanera* and *Badimia* (Lichenized Ascomycotina: Lecanorales). **Botanica Acta**. 107 (6): 369–472.
- Lücking, R. and L. I. Freraro. 1997. New species or interesting records of Foliicolous Lichens. I. *Trichothelium argenteum* (Lichenized Ascomycetes: Trichotheliaceae). **Lichenologist**. 29 (3): 217–220.
- Lücking, R. and A. Vězda. 1998. Taxonomic studies in foliicolous species of the genus *Porina* (Lichenized Ascomycetes: Trichotheliaceae) – II. The *Porina epiphylla* group. **Willdenowia** 28: 181–225.
- Lücking, R. and M. Cáceres. 1999. New species or interesting records of foliicolous lichens. IV. *Porina pseudoapplanata* (Lichenized Ascomycetes: Trichotheliaceae), A remarkable new species with *Phyllophiale* – type isidia. **Lichenologist**. 31 (4): 349–358.
- Lücking, R. and K. Kalb. 2000. Follikole flechten aus Brasilien (vornehmlich Amazonien), inklusive einer Checkliste und Bemerkungen zu *Coenogonium* und *Dimerella* (Gyalectaceae). **Botanische Jahrbücher für Systematik**. 122 (1): 1–61.
- Lücking, R., M. E. S. Cáceres, and E. Sérusiaux. 2001. Studies in *Bacidia* sensu lato (Lichenized Ascomycetes: Lecanorales). II. Six new combinations in *Fellhanera* Vězda. **Lichenologist**. 33 (3): 189–194.
- Lücking, R. and E. Sérusiaux. 2001. *Lastoloma stephanellum* com. nov. (Lichenized Ascomycetes: Ectolechiaceae). **Mycotaxon**. 77: 301–304.
- Lücking, R. and R. Santesson. 2001. New species or interesting records of foliicolous lichens. VIII. Two new taxa from tropical Africa, with a key to sorediate *Fellhanera* species. **Lichenologist**. 33 (2): 111–116.
- Malcolm, W. M. and A. Vězda. 1995a. Two new saxicolous species of the lichen genus *Byssoloma* from New Zealand. **Mycotaxon**. 55: 357–362.
- Malcolm, W. M., P. M. McCarthy, and G. Kantvilas. 1995. Further notes on the lichen genus *Porina* (Trichotheliaceae) in Tasmania and New Zealand. **Mycotaxon**. 55: 353–356.

- Makhija, U., B. Adawadkar, and P. G. Patwardhan. 1994. The lichen genus *Porina* (Family Trichotheliaceae) from India. **J. Econ. Tax. Bot.** 18 (3): 521–545.
- McCarthy, P. M. 1997. Three new species of *Porina* (Trichotheliaceae) from Lord Sowe Island, Australia. **Lichenologist**. 29 (3): 229–236.
- Noicharoen K., Polyiam W., Boonpragob K., Elix J.A. and Wulseley P.A. 2003. New Species of Parmotrema and Relicina (Ascomycota, Parmeliaceae) from Thailand. **Mycotaxon**. 85: 325–330.
- Sérusiaux, E. 1984. Three new species of *Tricharia* (Lichens, Asterothyriaceae) from New Guinea. **Mycologia**. 76 (1): 108–114.
- . 1985. Goniocysts, goniocystangia and *Opegrapha lambinonii* and related species. **Lichenologist**. 17 (1): 1–25.
- . 1991. *Porina rosei* sp. nov., Une espèce nouvelle d'europe occidentale. **Cryptogamie, Bryol. Lichénol.** 12 (1): 31–39.
- . 1992. Reinstatement of the lichenized genus *Eremothecella* Sydow. **Systema Ascomycetum**. 11 (1): 40–47.
- . 1996. Follicolous lichens from Madeira, with the description of a new genus and two new species and a world-wide key of follicolous *Fellhanera*. **Lichenologist**. 28 (3): 197–227.
- . 1997. *Strigula macaronesica*, a new species of follicolous lichen from Gomera and Madeira. **Lichenologist**. 29 (4): 333–337.
- . 1998a. Further observations on the Lichen Genus *Strigula* in New Zealand. **The Bryologist**. 101 (1): 147–152.
- . 1998b. Deux nouvelles espèces de *Byssoloma* Trev. (Lichens, Pilocarpaceae) D'Europe occidentale et de Macaronasia. **Cryptogamie, Bryol. Lichenol.** 19 (2–3): 197–209.
- Sérusiaux, E. and B. Polly. 1996. *Strigula kaitokensis* sp. nov. from New Zealand. **Mycotaxon** 59: 245–251.
- Singh, A. 1961. On follicolous species of *Porina* from Andaman Islands, India. **Plant Science**. 973–982.
- . 1970. Some follicolous members of Graphidaceae and Thelotremaaceae from Andaman Islands. **Plant Science**. 2: 80–82.
- Vězda, A. 1987 Follicole flechten aus Zaïre (III) Die Gattung *Byssoloma* Trevisan. **Folia geobotanica et phytotaxonomica** 22: 71–83.
- Wilde-Duyfjes, B. E. E. 1967. On the growth rate of the follicolous lichen *Strigula elegans*. **Persoonia** 4 (4): 429–432.



บัญชีรายชื่อไลเคนที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้อย (พ.ศ. 2542-2544)

Checklist of Lichens at Khao Yai National Park (1999-2001)

● เฉพาะกลุ่มมหไลเคน (macrolichens) และจุลไลเคน (microlichens)

*Acanthothecis consocians** (Nyl.) Staiger & Kalb, *Mycotaxon* 73: 97-98 (1999)

- ✦ *Graphis consocians* Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normand., ser. 2* (2): 116 (1868)

Aspicilia sp. 1 In Thrower, S. L. 1998. *Hong Kong Lichens* : 29.

*Astrothelium cinnamomeum** (Eschw.) Müll. Arg., *Flora* 68: 270 (1884)

- ✦ *Astrothelium minus* Müll. Arg., *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 382 (1885)
- ✦ *Astrothelium minus* var. *nigratum* Müll. Arg., *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 382 (1885)
- ✦ *Pyrenastrum cinnamomeum* Eschw., in Mart., *Icon. Pl. Crypt.* 18, pl. 9, f. 1. (1828)

*Astrothelium galbineum** Krempelh., *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 7: 58, pl. 1, f. 27. (1875)

- ✦ *Astrothelium ochrothelizum* Müll. Arg., *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 382. (1885)
- ✦ *Astrothelium conicum* var. *pallidum* Müll. Arg., *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 382. (1885)

Austroblastenia sp. 1 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 89

Austroblastenia sp. 2^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 89

Austroblastenia sp. 3^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 89

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไลเคนชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไลเคนที่ขึ้นตามกิ่งก้านของต้นไม้ในร่ม (canopy lichens)

- Bacidia cf. hunana** Zahlbr. In Thrower, S. L. 1998. *Hong Kong Lichens*: 60
- Bacidia incongruens** (Stirton) Zahlbr. In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 56
- Bacidia cf. medialis** (Tuck. in Nyl.) Zahlbr. In Thrower, S. L. 1998. *Hong Kong Lichens*: 61
- Bacidia subannexa** (Nyl.) Zahlbr. In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 56
- Bacidia* sp. 1 In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 23
- Bacidia* sp. 2^C In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 23
- Biatora sphaeroides** (Dicks.) Hornem., Dansk. Oecon. Pl. 2: 559 (1873)
- ✦ *Patellaria sphaeroides* (Dicks.) Müll. Arg., Nuovo Giorn. Bot. Ital. 24: 198 (1892)
- Biatora vernalis** (L.) Fr. In Purvis et al. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 121
- ✦ *Lecidea vernalis* (L.) Ach. (1803) In Purvis et al. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 121
- Biatora* sp. 1^C In Purvis et al. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 119
- Buellia curatellae** Malme, Ark. Bot. 21A(14): 18 (1927)
- Buellia disciformis*^C * (Fr.) Mudd, Man. Brit. Lich.: 216 (1861)
- ✦ *Buellia parasema* var. *vilgata* Th. Fr., Lichenogr. Scand. 1: 590 (1874)
- Buellia myriocarpa* (D.C) De Not var. *polyspora* Willey in Tuck., Syn. N. Amer. Lich. 2: 97 (1888)
- Buellia polyspora** (Willey) Vain., Enum. Lich. Brés. 1: 171 (1890)
- Buellia punctata** (Hoffm) Massal. In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 75
- Buellia tinctoria** (Stein) Magnusson In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 72
- Buellia* sp. 1^C In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 19

* ไหล่หินที่หายากหรือพบครั้งแรกในไทย (new records)

** ไหล่หินที่อาจเป็นชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไหล่หินที่ขึ้นตามร่มเงาของต้นไม้หรือพืช (canopy lichens)

Buellia sp. 2^C In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 19

Bulbothrix goebellii^C (Zenker) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 32: 14 (1976)

- *Parmelia goebellii* Zenker in F. Goebel & G. Kunze, *Pharm. Waarenk.* 1: 134 (1827)
- *Parmelia subdissecta* Nyl. in W. Nylander & J. M. M. Crombie, *J. Linn. Soc., Bot.* 20: 51 (1883)
- *Bulbothrix subdissecta* (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 481 (1974)

Bulbothrix hypocraea^C (Vain.) Hale, *Phytologia* 28: 480 (1974)

- *Parmelia hypocraea* Vain., *Cat. Webs. Pl.* 2(2): 400 (1901)

Bulbothrix isidiza^C (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 480 (1974)

- *Parmelia isidiza* Nyl., *Bull. Soc. Broter.* 3: 130 (1884)

Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 480 (1974)

- *Parmelia tiliacea* var. *meizospora* Nyl. *Syn. Lich.* 1(2): 383 (1860)

Bulbothrix pigmentacea^C (Hale) Hale, *Phytologia* 28: 481 (1974)

- *Parmelia pigmentacea* Hale, *Journ. Jap. Bot.* 43: 325 (1968)

Bulbothrix queenslandica^C (Elix & G.N. Stevens) Elix, *Mycotaxon* 47: 126 (1993)

- *Parmelia queenslandica* Elix & G.N. Stevens, *Austral. J. Bot.* 27: 873 (1979)

Bulbothrix sensibilis (Stein. and Zahlbr.) Hale, *Phytologia* 28: 481 (1974)

- *Parmelia sensibilis* Stein. and Zahlbr. *Bot. Jahrb.* 60: 522 (1926)

Bulbothrix tabacina^C (Mont. and v.d. Bosch) Hale, *Phytologia* 28: 481 (1974)

- *Parmelia tabacina* Mont. & v.d. Bosch in Mont. *Sylloge Gen. Spec. Crypt.* 327 (1856)
- *Parmelia meizospora* f. *isidiosa* Müll. Arg., *Flora* 67: 620 (1884)

Bulbothrix ventricosa^{*} (Hale and Kurok.) Hale, *Phytologia* 28: 481 (1974)

- *Parmelia ventricosa* Hale and Kurok., *Contr. U. S. Nat. Herb.* 36: 140 (1964)

Byssoloma sp. 1 In Purvis *et al.* 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 137

Campylothelium nitidum Müll. Arg., *Bibl. Liche.* 40: 90 (1991)

* ไมโครลิเชนหายาก/ไมโครลิเชนใหม่ (new records)

** ไมโครลิเชนใหม่ (probable new species)

^C ไมโครลิเชนหายากจากธรรมชาติบนพืช (canopy lichens)

Canoparmelia owariensis (Asah.) Elix, *Mycotaxon* 47: 127 (1993)

- *Paraparmelia owariensis* (Asah.) Elix & J. Johnst., *Mycotaxon* 27: 280 (1986)
- *Pseudoparmelia owariensis* (Asah.) Hale, *Phytologia* 29: 190 (1974)
- *Parmelia owariensis* Asah., *J. Jap. Bot.* 28: 135 (1953)

*Cladonia borbonica** Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normandie, sér 2* (2): 47 (1868)

- *Cladonia fimbriata* var. *coniocraea* f. *intermedia* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot., sér 4* (12): 280 (1859)
- *Cladonia degenerans* var. *ramosa* Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normandie, sér 2* (2): 48 (1868)
- *Cladonia poeciloclada* Abbayes, *Rev. Bryol. Lichénol.* 33: 236 (1964)
- *Cladonia physodolica* Elix, *Lich. Australas. exs., fasc. 9*: (unnumbered page) 2 (1990)

*Cladonia cartilaginea** Müll. Arg., *Flora* 63: 260 (1880)

- *Cladonia cartilaginea* var. *polycephala* Müll. Arg., *Hedwigia* 30: 223 (1891)
- *Cladonia cartilaginea* f. *reagens* Vain., *Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.* 10: 22 (1894)

Cladonia fruticulosa Kremp., *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* 30: 331 (1881)

- *Cladonia formosana* Asah., *J. Jap. Bot.* 17: 485 (1941)

Cladonia macilenta Hoffm., *Deutschl. Fl.* 2: 126 (1796)

- *Baeomyces scolecinius* Ach., *Methodus* 324 (1803)
- *Cenomyce clavulus* Dufour, *Ann. Gén. Sci. Phys.* 8: 54 (1821)
- *Cladonia pseudocornuta* Delise in Duby, *Bot. gall.* 2: 634 (1830)
- *Cladonia bacillaris* Genth, *Fl. Nassau* 406 (1835)
- *Cladonia macilenta* var. *ostreata* Nyl., *Syn. meth. lich.* 1: 225 (1860)
- *Cenomyce albicans* Delise ex Lighton, *Ann. Mag. Nat. Hist., ser 3* (18): 4 (1866)
- *Cladonia balfourii* Crombie, *J. Linn. Soc., Bot.* 15: 433 (1877)
- *Cladonia floerkeana* subsp. *bacillaris* var. *clavata* subvar. *elegantior* Vain., *Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.* 4: 97 (1887)
- *Cladonia jamaicensis* G. Merrill ex Vareschi, *Acta Bot. Venez.* 8: 198 (1973)

* ไม่นับว่าเป็นการค้นพบใหม่ในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับว่าเป็นใหม่ (probable new species)

c ไม่นับว่าเป็นการค้นพบใหม่เพราะเป็นไลเคนบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Cladonia mauritina** Ahti & J. C. David in David & Hawksworth, *Bibl. Lichenol.* 57: 94 (1995)
- Cladonia singhii** Ahti & Dixit, *Lichenologist* 34 (4): 305–310 (2002)
- Cladonia squamosa* Hoffm., *Deutschl. Fl.* 2: 125 (1796)
- ✦ *Cladonia delicata* var. *subsquamosa* Nyl. ex Leighton, *Lich. fl. Gr. Brit.* 59 (1871)
 - ✦ *Cladonia patagonica* A. Evans, *Rev. Bryol. Lichenol.* 24: 135 (1955)
- Cladonia submultiformis** Asah., *J. Jap. Bot.* 18: 624 (1942)
- Cladonia tenuicaulis** Nuno, *J. Jap. Bot.* 47: 136 (1972)
- Cladonia* sp. 1 In Ahti, T. 2000. Cladoniaceae. *Flora Neotropica Monograph* 78.
- Cladonia* sp. 2 In Ahti, T. 2000. Cladoniaceae. *Flora Neotropica Monograph* 78.
- Coccocarpia adnata* Arv., *Opera Bot.* 67: 42 (1982)
- Coccocarpia dissecta* Swinscow & Korg., *Norw. J. Bot.* 23: 254 (1976)
- Coccocarpia erythrocyli* (Spreng.) Swinscow & Korg., *Norw. J. Bot.* 23: 256 (1976)
- ✦ *Lecidea erythrocyli* Spreng., *K. svenska VetenskAkad. Nya Handl.* 1: 47 (1820)
- Coccocarpia glaucina* Kremp., *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* VII:5–67 (1875)
- Coccocarpia palmicola*^c (Sprengel.) L. Arv. & D. J. Galloway, *Bot. Notiser* 132: 242 (1979)
- ✦ *Lecidea palmicola* Sprengel, *K. svenska VetenskAkad. Nya Handl.* 1: 46 (1820)
- Coccocarpia pellita* (Ach.) Müll. Arg., *Flora, Jena* 65: 320 (1882)
- ✦ *Parmelia pellita* Ach., *Lich. Univ.* : 468 (1810)
- Collema coilocarpum* (Müll. Arg.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 3: 34 (1924)
- ✦ *Synechoblastus coilocarpum* Müll. Arg., *Flora, Jena* 74: 107 (1891)
- Collema kauense* Degel., *Symb. bot. upsal.* 20 (2): 89 (1974)
- Collema* sp. 1 In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*: 66–67
- Cyclographina citri** Vain. ex D.D.Awasthi & M. Joshi, *Norw. J. Bot.* 26: 170 (1979).
- ✦ *Helminthocarpon citri* Vain. in Herb. (unpublished paper)

* ไลเคนที่รายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไลเคนชนิดใหม่ (probable new species)

^c ไลเคนที่รายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Cyclographina cubana** Vain. ex. D.D. Awasthi & M. Joshi, *Norw. J. Bot.* 26: 170 (1979).
- *Helminthocarpon cubana* Vain. in Herb. (unpublished paper)
- Cyclographina huloglauca** (Nyl.) D.D. Awasthi & M. Joshi, *Fascicle VIII* (No. 301–350) –Neumarkt/ opt. 16 pp. page 7
- *Cyclographina huloglauca* Nyl. *Flora* 49: 129–135 (1866).
 - *Graphina huloglauca* (Nyl.) Zahlbr. *Nat. Kl.* 83: 85–211 (1909).
- Cyclographina imaculata*^{C*} (Stein) Awas. & M. Joshi *Norw. J. Bot.* 26: 175 (1979).
- Cyclographina lojkana** (Müll. Arg.) D.D. Awasthi & M. Joshi, *Norw. J. Bot.* 26: 175 (1979).
- *Helminthocarpon lojkanum* Müll. Arg., *Flora* 70: 423 (1887).
- Cyclographina platyleuca** (Nyl.) D.D. Awasthi & M. Joshi, *Norw. J. Bot.* 26: 174 (1979).
- *Graphis platyleuca* Nyl., *Bull. Soc. Lin. Normand. ser. 2* (2): 75 (1868).
 - *Helminthocarpon platyleucum* (Nyl.) Müll. Arg., *Flora* 70: 423 (1887).
- Cyclographina* sp. 1 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 2 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 3 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 4 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 5 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 6 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* โยคอินวาระนเกกคตพในประเทไคโอ (new records)

** โยคอินวาระนเกกคตพ (probable new species)

^C โยคอินวาระนเกกคตพบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Cyclographina* sp. 7 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 8 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Cyclographina* sp. 9 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Dimerella isidiata** Thor & Vězda In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 112
- Dimerella nepalensis** Thor & Vězda In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 113
- Dirinaria aegialita*^C (Ach.) Moore. *Bryologist* 71: 248 (1968)
- *Parmelia aegialita* Ach. *Meth. Lich.*: 191 (1803)
- Dirinaria applanata* (Fée) Awasthi, *J. Indian bot. Soc.* 49: 135 (1970)
- *Parmelia applanata* Fée, *Essai. Crypt.*: 126 (1824)
- Dirinaria confluens*^C (Fr.) Awasthi, *Bibliotheca Lich.* 2: 28 (1975)
- *Parmelia confluens* Fr., *Syst. Orb.* 1: 284 (1825)
- Dirinaria picta*^C (Swartz) Clement & Shear, *Gen. Fung.*: 323 (1931)
- *Lichen pictas* Swartz, *Nov Gen. Sp. Pl.*: 146 (1788)
- Erioderma mollissimum*^{C*} (Samp.) Du Rietz, *Bot. Notiser.* 339 (1926).
- *Lobaria mollissima* Samp., *Liquénes Inédits* : 7 (1920)
- Erioderma sorediatum*^C D. J. Galloway & M. Jorg., *Lichenologist* 7: 139 (1975)
- Glyphis cicatricosa** Ach. *Syn. Lich.*: 107 (1814).
- *Glyphis verruculosa* Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 457 (1923).
 - *Glyphis verrucosa* C. Knight, *Proc. Roy. Soc. Qld.* 6: 214 (1889).
 - *Glyphis cicatricosa* Ach. var. *depauperata* (Müll. Arg.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 456 (1923).
 - *Glyphis favulosa* Ach. var. *depauperata* Müll. Arg. *Hedwigia* 30: 54 (1891).

* ไม่เคยมีรายงานการพบในบริเวณนี้มาก่อน (new records)

** ไม่เคยมีบันทึก (probable new species)

^C ไม่เคยมีรายงานการพบเฉพาะบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Graphina acharii* (Fée) Müll. Arg. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève* 29, no. 8: 38., (1887)
- ✦ *Graphis acharii* Fée, *Ess. Cryptog. Ecorc. Offic.* 39. (1824)
- Graphina colliculosa** (Mont.) Hale, *Lich. Americani Exsiccati* no. 156 (1976)
- ✦ *Sclerophyton colliculosum* Mont. *Ann. Sci. Nat. Bot.*, 61 (1851)
- Graphina fissofurcata** (Light.) Müll. Arg. *Flora* 65: 385 (1882)
- ✦ *Graphis fissofurcata* Leighton, *Trans. Linn. Soc. London, Bot.* 27: 177 (1869)
 - ✦ *Graphis hiascens* (Fée) Müll. Arg. var. *clausior* Vain. In *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15 (6): 204 (1920)
 - ✦ *Graphina tjibodensis* Zahlbr. in *Ann. Cryptog. Exot.* 1: 137 (1928)
- Graphina incrustans* (Fée) Müll. Arg. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève* 29:47. (1887)
- ✦ *Fissurina incrustans* Fée, *Essai Crypt.* 60. Pl. 13, f.2. (1824)
- Graphina insignis** (Vain.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2:410 (1923)
- ✦ *Graphis insignis* Vain. *Acta Soc. Fann. Fl. Fenn.* 7 (7): 112 (1890)
 - ✦ *Graphina insignis* var. *primaria* Redgr. *Ark. Bot.* 25A (1): 21 (1933)
 - ✦ *Graphina insignis* var. *imperfecta* Redgr. *Ark. Bot.* 26A (1): 21 (1933)
 - ✦ *Graphina insignis* var. *tartarea* Redgr. *Ark. Bot.* 26A (1): 22 (1933)
- Graphina lumbschii* var. *deficiens** A. W. Archer, *Mycotaxon* 77: 153–180 (2001)
- Graphina marcescens** (Fée) Müll. Arg., *Mém. Soc. Phys. Et Hist. Nat. Genève*, 29 (8): 42, (1887)
- ✦ *Graphina marcescens* Fée. *Essai Cryptog. Ecorc. Offic.*, p 38. (1824)
 - ✦ *Graphis intricata* Eschw. In Martius, *Flora Brasiliensis seu enumeratio plantarum in Brasilia tam sua sponte quam accedente cultur provenientum I* (1): 79 (1833)
 - ✦ *Graphina plittii* Zahlbr., *Annal. Naturhist. Mus. Wien*, 42: 60 (1928)
- Graphina suberythrella** Hale, *Smithsonian Contr. Bot.*, No. 40. (1978)
- Graphina vestita* M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon, *Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. B*, 27(2, 3) 53 (2001)
- Graphina* sp. 1 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* ไหลย่นที่รายงานพบเป็นครั้งแรกในไทย (new records)

** ไหลย่นชนิดใหม่ (probable new species)

* ไหลย่นที่รายงานพบเฉพาะบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Graphina* sp. 2 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphina* sp. 3 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphina* sp. 4 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphina* sp. 5 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphina* sp. 6 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphina* sp. 7 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis afzelii*^c Ach., *Syn. Lich.*: 85 (1814)
- * *Graphis nirea* Fée, *Essai Crypt. Ecore. Offic.* (1824)
 - * *Graphis atroalba* Vain. *Acta Soc. Faun. Fl. Fenn.* 7 (7): 123 (1890)
 - * *Graphis atrolenca* Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 294 (1923)
- Graphis anfractuosa*^a Eschw., in *Martius, Fl. Brasil.* 1: 86 (1833)
- * *Graphis parallela* Müll. Arg., *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 24: 200 (1892)
 - * *Opegrapha anfractuosa* Mont. in *Ann. Sc. Nat., ser. 2* (18): 273 (1842)
- Graphis apertella*^a A.W. Archer., *Australia Systematic Botany* 14: 245–271 (2001)
- Graphis aphanes* Mont. et v.d. Bosch, *Jungh., Plant. Junghuhn., fasc.* 4: 474 (1855)
- * *Graphis glaucocinerea* Vain. *Hedwigia*, 46: 178 (1907)
- Graphis candidata*^a Nyl., *Nylander, W. Flora* 52: 72 (1874)
- * *Graphis singaporina* Nyl. *Nylander, w. Sertum Lichenaceae tropicae e Labuan et Singapore*: 23 (1891)

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่ทราบชนิดใหม่ (probable new species)

^c ไม่เคยมีรายงานการพบตามบนเรือนยอด (canopy lichens)

- * *Graphis illinata* var. *vermiformis* Eschw. apud Martius, *Fl. Brasil.* 1 (1833)

*Graphis cinnabarina** Fée. *Essai Sur Les Cryptogames de Ecorces exotique officinales*: 44. (1924)

- * *Phaeographina cinnabarina* (Fée) Müll. Arg. *Graphideae FEENAE. Mem.*

*Graphis cognata** Müll. Arg., *Nuov. Giorn. Bot. Ital.*, 24: 200 (1892)

- * *Graphis parallela* Müll. Arg. in *Proc. Phil. Soc. Glasgow*, 13: 187 (1881)

*Graphis dumastoides** Fink., *Mycologia*, 19: 213 (1927)

*Graphis duplicata** Ach., *Synops. Lich.* 81 (1814)

Graphis elegans (Smith.) Ach., *Syn. Meth. Lich.* 85 (1814)

- * *Opegrapha elegans* Smith in Smith and Sowergy, *Engl. Bot.* 26: pl. (1807)

*Graphis emersa** Müll. Arg., *Hedwigea* 32: 132 (1893)

*Graphis humilis** Vain. *Ann. Acad. Sci Fenn.* 15A: 256 (1921)

*Graphis immersella** Müll. Arg. *Bull. herb. Boissier*: 319 (1895)

*Graphis immersicans** A.W. Archer, *Aust. Sys. Bot.* 14 (2001)

*Graphis kakaduensis** A.W. Archer, *Aust. Sys. Bot.* 14 (2001)

*Graphis longiramea** Müll. Arg., *J. Linn. Soc. Bot.* 29: 225 (1892)

Graphis rimulosa (Mont.) Trev., *Spighe e Paglie* 11 (1853)

- * *Opegrapha rimulosa* Mont., *Ann. Sci. Nat. Bot.* II. 18: 271 (1842)

*Graphis stenospora** Müll. Arg., *Flora* 65 : 334 (1882)

Graphis subassimilis^C* Müll. Arg., *Flora* 65 : 333 (1882)

*Graphis tenella** Ach., *Synops. Lich.*: 81 (1814)

*Graphis treubii** Zahlbr., *Ann. Cryptog. exot.* 1: 129 (1928)

*Graphis turgidula** Müll. Arg., *J. Linn. Soc. Bot. London* 30: 457 (1895)

Graphis turgidula var. *norstictica** A.W. Archer., *Aust. Sys. Bot.* 14, (2001)

*Graphis vermifera** Müll. Arg., *Flora* 70: 401 (1887)

Graphis sp. 1 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

Graphis sp. 2 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* ไก่ชนิดนี้ไม่เคยพบในประเทศไทย (new records)

** ไก่ชนิดนี้ใหม่ (probable new species)

^C ไก่ที่ขึ้นตามยอดไม้ในป่าดิบชื้น (canopy lichens)

- Graphis* sp. 3 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 4 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 5 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 6 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 7 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 8 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 9 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Graphis* sp. 10^C In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Haematomma puniceum*^C (Sm. ex Ach.) Massal. In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 143
- Heterodermia appendiculata*^{C*} (Kurok.) Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 114 (1976)
- *Anaptychia appendiculata* Kurok., *Beih. Nova Hewegia* 6: 61 (1962)
- Heterodermia comosa*^{*} (Eschw.) Follm. & Rédon, *Willdenowia* 6: 446 (1972)
- *Parmelia comosa* Eschw. in Mart., *Icon. Pl. Crypt.* 1: 26 (1828)
- Heterodermia diademata* (Taylor) Awasthi, *Geophytology* 3: 113 (1973)
- *Anaptychia diademata* Taylor, *J. Bot., Lond.* 6: 165 (1847)
- Heterodermia flabellata*^{C*} (Fée) Awasthi, *Geophytology* 3: 113 (1973)
- *Parmelia flabellata* Fée, *Essai Crypt. Suppl.*: 122 (1837)
- Heterodermia hypochraea*^{C*} (Vainio) Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 119 (1976)
- *Anaptychia hypochraea* Vainio, *Bot. Mag., Tokyo* 35: 59 (1921)

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่ทราบถิ่นกำเนิด (probable new species)

^C ไม่เคยมีรายงานการพบตามแนวเรือนยอด (canopy lichens)

- Heterodermia cf. hypoleuca*^C (Ach.) Trevisan, *Atti Soc. ital. Sci. nat.* 11: 615 ((1868) 1869)
- *Parmelia speciosa* b. *hypoleuca* Ach., *Syn. Lich.*: 211 (1814)
- Heterodermia isidiophora*^{*} (Vainio) Awasthi, *Geophytologia* 3: 114 (1973)
- *Anaptychia isidiophora* Vainio, *Cat. Afr. Pl. Coll. Welwitsch* 2: 405 (1901)
- Heterodermia japonica*^{C*} (Sato) Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 122 (1976)
- *Anaptychia japonica* (Sato) Kurok., *Beih. Nova Hedwigia* 6: 58 (1962)
- Heterodermia lepidota*^{C*} Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 122 (1976)
- Heterodermia magellanica*^{C*} (Zahlbr) Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 130 (1976)
- *Anaptychia magellanica* Zahlbr., *K. svenska Vetensk Akad. Handl.* 57: 54 (1917)
- Heterodermia microphylla*^C (Kurok.) Swinscow & Krog, *Lichenologist* 8: 132 (1976)
- *Anaptychia hypoleuca* (Kurok.), *Beih. Nova Hedwigia* 6: 44 (1962)
- Heterodermia obscurata*^{C*} (Nyl.) Trevisan, *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 1: 114 (1869)
- *Physia obscurata* Nyl., *Ann. Sci. nat. Bot., Ser. 4* (19): 310 (1863)
- Heterodermia cf. pseudospeciosa*^{C*} (Kurok.) W. Culb., *Bryologist* 69: 484 (1966)
- *Anaptychia pseudospeciosa* Kurok., *J. Jap. Bot.* 34: 176 (1959)
- Heterodermia speciosa*^C (Wulfen) Trevisan, *Atti Soc. Ital. Sci. Nat.* 11: 614 ((1868) 1869)
- *Lichen speciosa* Wulfen in Jacq., *Coll. Bot.* 3: 119 (1789)
- Heterodermia* sp. 1^C Swinscow, T. D. V. and H. Krog, 1988. *Macrolichens of East Africa*.
- Hyperphysia adglutinata*^{*} (Flörke) Mayrh & Poelt, *Herzogia* 5: 62 (1979)
- *Lecanora adglutinata* Flörke, *Dtsch. Lich.* 4: 7 (1819)
- Hypotrachyna adducta* (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 340 (1974)
- *Parmelia adducta* Nyl., *Flora* 68: 610 (1885)
- Hypotrachyna brevirhiza*^{*} (Kurok.) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 25: 26 (1975)
- *Parmelia brevirhiza* Kurok. in M. E. Hale & S. Kurokawa, *Contr. U. S. Natl Herb.* 36: 166 (1964)

* ไหลย่นที่รายงานการพบในบริเวณใหม่ (new records)

** ไหลย่นชนิดใหม่ (probable new species)

C ไหลย่นที่รายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Hypotrachyna coorgiana* Patw. & A. V. Prabhu., *The Bryologist* 80: 348 (1977)
- Hypotrachyna* cf. *croceopustulata*^C (Kurok.) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 25: 30 (1975)
- *Parmelia croceopustulata* Kurok., in Hale & Kurokawa, *Contr. U. S. Natn. Herb.* 36 (4): 169 (1964)
- Hypotrachyna ducilis*^C (Jatta) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 25: 33 (1975)
- *Parmelia ducilis* Jatta, *Annali Bot.* 6: 407 (1908)
- Hypotrachyna gondylophora*^{C*} (Hale) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 25: 40 (1975)
- *Parmelia gondylophora* Hale, *Bryologist* 70: 420 (1967)
- Hypotrachyna kingii* (Hale) Hale, *Phytologia* 28: 34 (1974)
- *Parmelia kingii* Hale, *J. Jap. Bot.* 43: 324 (1968)
- Hypotrachyna osseoalba*^C (Vain.) Park & Hale, *Taxon* 38: 88 (1989)
- *Parmelia osseoalba* Vain., *Ann. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo* 1: 39 (1921)
- Hypotrachyna sublaevigata*^{*} (Nyl.) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 25: 66 (1975)
- *Parmelia tiliacea* var. *sublaevigata* Nyl., *Syn. Meth. Lich.* 1(2): 383 (1860)
- Laurera benguelensis*^C (Müll. Arg.) Zahlbr., *Cata. Lich. Univ.* 1: 503 (1922)
- *Bathelium benguelense* Müll. Arg., *Flora* 68: 256 (1885)
 - *Trypethelium madreporiforme* sensu Nyl., *Flora* 52: 73 (1869)
- Laurera keralensis*^{*} Upreti & A. Singh., *Bull. Jard. Bot. Belg.* 57: 374 (1987)
- Laurera madreporiformis*^{C*} (Eschw.) Riddle apud Howe, *Torreya* 16: 50 (1916)
- *Trypethelium madreporiformis* Eschw., *Syst. Lich.*: 24 (1824)
- Laurera megasperma*^{*} (Mont.) Riddle, *Bull. Torrey Bot. Club*, 44: 323 (1917)
- *Trypethelium megaspermum* Mont., *Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2*, (19): 68 (1843)
- Laurera meristospora*^C (Mont. et v. d. Bosch) Zahlbr. *Catal. n.* (1735)
- Laurera subdiscreta*^{*} (Nyl.) Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 1: 506 (1922)
- *Trypethelium subdiscretum* Nyl., *Flora* 52: 73 (1869)
- Laurera tuberculosa*^{*} Makhija & Patw., *Mycotaxon*, 31: 584–583 (1988)
- Lecania* sp. 1 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่แน่นอนใหม่ (probable new species)

^C ไม่พบที่บริเวณยอดไม้หรือพุ่มไม้เรือนยอด (canopy lichens)

- Lecania* sp. 2 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79
- Lecanora cenisia*^C* Ach., *Lich. Univ.* 361. 1810.
- Lecanora muralis** (Schreb.) Rabenh., *Deutschl. Krypt.-Fl.* 2: 42 (1845)
- Lecanora polytrapa*^C* (Hoffm.) Rabenh. (1845) In Purvis *et al.* 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland*: 311
- Lecanora* sp. 1^C In Purvis *et al.* 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland*: 292–293
- Lecidia* sp. 1^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Leptogium azureum* (Ach.) Mont., in Webb & Berthelot, *Hist. Nat. Iles. Canar.* 3(2): 129 (1840)
- ✱ *Lichen azureus* Ach., *Lich. Suec. Prodr.*: 137 (1798)
- Leptogium californicum* Tuck., *Syn. N. Am. Lich.* 1: 159 (1882)
- Leptogium cochleatum** (Dickson) M. Jorg. & P. James, *Lichenologist* 15: 113 (1983)
- ✱ *Lichen cochleatus* Dickson, *Fasc. Crypt. Br.* 1: 13 (1785)
- Leptogium crispatellum* Nyl., *Lich. Nov. Zel.*: 10 (1888)
- Leptogium cyanescens* (Rabenh.) Körb., *Syst. Lich. Germ.* : 420 (1855)
- ✱ *Collema cyanescens* Rabenh., *Dtsch. Kryptfl.* 2: 50 (1845)
- Leptogium gelatinosum** (With.) J. R. Laundon, *Lichenologist* 16: 219 (1984)
- ✱ *Lichen sinuatum* (Huds.) A. Massal., *Mem. Lichenogr.*: 88 (1853)
- Leptogium marginellum* (Sw.) Gray, *Nat. Arr. Br. Pl.* 1: 401 (1821)
- ✱ *Lichen marginellus* Sw., *Nov. Gen. Sp. PL*: 147 (1788)
- Leptogium pichneum* (Ach.) Nyl., *Act. Soc. Sci. Fenn.* 26: 3 (1900)
- Leptogium plicatile** (Ach.) Leight., *Lich. Fl. Great Britain*, ed. 3: 30. (1897)
- ✱ *Lichen plicatilis* Ach., *K. Vetensk. Acad. Nya Handl.* 16: 11 (1795)
- Leptogium poliophaeum** Verdon, *Mycotaxon* 37: 420 (1990)
- Leptogium* sp. 1 In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*.
- Leptogium* sp. 2 In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*.

* ไม่พบในวรรณกรรมก่อนการเก็บใหม่ (new records)

** ไม่พบชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไม่พบในวรรณกรรมก่อนการเก็บบนเรือนยอด (canopy lichens)

Leptogium sp. 3 In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*.

Leptogium sp. 4^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*.

*Letrouitia transgressa** (Malme) Hafellner & Bellem., *Nova Hedwigia* 35: 710 (1983)

Letrouitia vulpina (Tuck.) Hafellner & Bellem., *Nova Hedwigia* 35: 281 (1982)

- *Lopadium vulpinum* (Tuck.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 4: 316 (1926)
- *Heterothecium vulpinum* (Tuck.) Tuck., *Syn. N. Amer. Lich.* 2: 57 (1888)
- *Heterothecium vulpinum* f. *corallinum* Müll. Arg., *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 23: 393 (1891)
- *Heterothecium vulpinum* var. *glaucescens* Müll. Arg., *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 23: 393 (1891)
- *Lopadium vulpinum* var. *glaucescens* (Müll. Arg.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 4: 316 (1926)

Letrouitia sp. 1^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Maronea sp. 1 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Maronea sp. 2 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Maronea sp. 3^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Maronea sp. 4^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Maronina sp. 1 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83

Myelochroa sp. 1^C Elix, J.A. 1994 . *Parmeliaceae, Key to Genera in Flora of Australia* 53: 6.

*Myriotrema costaricense** (Müll.Arg.) Hale, *Mycotaxon* 11: 133 (1980).

- *Ocellularia costaricensis* Müll. Arg., *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 30: 75 (1891).

* ไมโครลิเชนที่พบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** ไมโครลิเชนชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไมโครลิเชนที่พบบนเรือนยอดต้นไม้ (canopy lichens)

- *Ocellularia alba* f. *costaricensis* (Müll. Arg.) Redinger, *Ark. Bot.* 28A(8): 45 (1936).
- *Rhabdodiscus costaricensis* (Müll. Arg.) Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 184 (1921).

*Myriotrema fissurinum** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 279 (1981).

*Myriotrema grandisporum*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.

*Myriotrema khaoyalanum*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.

*Myriotrema masonhalei** (Patw. & C.R.Kulk.) Hale, *Mycotaxon* 11: 134 (1980).

- *Thelotrema masonhalei* Patw. & C.R. Kulk., *Nord. J. Bot.* 24: 128 (1977).

*Myriotrema microporum** (Mont.) Hale, *Mycotaxon* 11: 134 (1980).

- *Thelotrema microsporum* Mont., *Ann. Sci. Nat. Bot. sér.* 3 (10): 130 (1848).
- *Thelotrema crassulum* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot. sér.* 4 (11): 258 (1859).
- *Ocellularia micropora* (Mont.) Müll. Arg., *Flora, Jena* 74: 112 (1891).
- *Ocellularia crassula* (Nyl.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 588 (1923).

*Myriotrema subanamaliense*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.

*Myriotrema subminutum*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.

*Myriotrema thailandicum*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.

*Ocellularia allosporoides** (Nyl.) Patw. & C.R.Kulk., *Kavaka* 5: 5 (1977).

- *Thelotrema allosporoides* Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normandie, sér.* 2 (7): 167 (1873).
- *Leptotrema allosporoides* (Nyl.) Müll. Arg., *Bull. Herb. Boissier* 2: append. 1: 25 (1894).

Ocellularia arecae (Vain.) Hale, *Mycotaxon* 11: 136 (1980).

- *Ascidium interpositum* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot. sér.* 4 (19): 335–6, footnote (1863).
- *Thelotrema interpositum* (Nyl.) Müll. Arg., *Flora, Regensburg* 64: 526 (1881).

* ไม่นับว่ามีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับว่ามีถิ่นใหม่ (probable new species)

c ไม่นับว่ามีรายงานการพบตามธรรมชาติ (casual lichens)

- ✦ *Thelotrema arecae* Vain. *Hedwigia* 46: 174 (1907)
- ✦ *Leptotrema arecae* Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 631 (1923)
- ✦ *Thelotrema turgidulum* ['turgidula'] Vain., *Bol. Soc. Brot. sér. 2* (6): 150 (1929) [non (Müll. Arg.) Hale (1980)]
- ✦ *Thelotrema sanfordianum* Zahlbr., *Ann. Mycol.* 33: 41 (1935)

*Ocellularia ascidioides** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 300 (1981)

*Ocellularia concolor** Meyen & Flotow, *Novo Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. German. Nat. Cur.* 19: 230 (1843); *Cat. Lich. Univ.* 2: 587 (1924)

*Ocellularia crassa** (Müll. Arg.) Hale, *Mycotaxon* 11: 136 (1980)

- ✦ *Leptotrema crassa* Müll. Arg. *Flora, Jena* 65: 332 (1882)
- ✦ *Leptotrema fallax* Müll. Arg., *Flora, Jena* 70: 62 (1887)
- ✦ *Leptotrema integrum* Müll. Arg., *Flora, Jena* 70: 399 (1887)
- ✦ *Thelotrema vesiculiferum* Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Sér. A*, 15 (6): 175 (1921)
- ✦ *Leptotrema vesticuliferum* (Vain.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 641 (1923)

*Ocellularia diacida** Hale, *Mycotaxon* 7: 378 (1978)

*Ocellularia dolichotata** (Nyl.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 589 (1923)

- ✦ *Thelotrema dolichotatum* Nyl., *Sert. Lich. Trop. Labaun Singapore*: 19 (1891)
- ✦ *Thelotrema siamense* Vain., *Hedwigia* 47: 175 (1907)
- ✦ *Ocellularia siamensis* (Vain.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 600 (1923)

*Ocellularia emersa** (Kremp.) Müll. Arg., *Flora, Jena* 69: 310 (1886)

- ✦ *Thelotrema emersum* Kremp., *Flora, Jena* 59: 221 (1876)
- ✦ *Thelotrema efformatum* Kremp., *Flora, Jena* 59: 221 (1876)
- ✦ *Thelotrema schizostomum* Kremp., *Flora, Jena* 59: 222 (1876)
- ✦ *Ocellularia emersella* Müll. Arg., *J. Linn. Soc., Bot.* 30: 453 (1895)
- ✦ *Phaeotrema emersum* (Kremp.) Zahlbr., *Denkschr. Kaiservl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.* 83: 119 (1909)

*Ocellularia groenhartii** Hale, *Mycotaxon* 3 (1): 173 (1975)

*Ocellularia kansriae*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 133–140.

*Ocellularia leucina** (Müll. Arg.) Hale, *Mycotaxon* 11: 137 (1980)

- ✦ *Thelotrema leucinum* Müll. Arg. *Rev. Mycol.* 35: 10 (1887)

*Ocellularia major*** Homchantara & Coppins, *Lichenologist* 34 (2): 133–140.

* ไบโอสเต็มใหม่จากการพบในต่างประเทศใหม่ (new records)

** ไบโอสเต็มใหม่ (probable new species)

† ไบโอสเต็มใหม่จากการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

*Ocellularia marivelensis** (Vain.) Hale, *Mycotaxon* 11: 137 (1980)

- * *Thelotrema marivelense* Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 176 (1921)
- * *Leptotrema marivelense* (Vain.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 637 (1923)

*Ocellularia massalongoi** (Mont.) Hale, *Mycotaxon* 11: 137 (1980)

- * *Ascidium massalongoi* ['Massalongi'] Mont., *Ann. Sci. Nat. Bot.* 4 (14): 174 (1860)
- * *Macropyrenium pertusarioides* Hampe, *Massal., Exame Comp.*: 330 (1860)
- * *Ascidium monobactrium* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot. sér.* 4 (15): 53 (1861)
- * *Ascidium pachystomum* Leight., *Trans. Linn. Soc. London* 27: 171 (1870)
- * *Thelotrema pachystomum* (Leight.) Müll. Arg., *Flora, Jena* 74: 112 (1891)
- * *Thelotrema monobacterium* var. *subgranulatum* Nyl., *Sert. Lich. Trop. Labuan Singapore* 6: (1891)
- * *Thelotrema monobacterium* (Nyl.) Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 177 (1921)
- * *Thelotrema marginans* Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 170 (1921)
- * *Thelotrema monobacterium* var. *endoleucum* Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 178 (1921)
- * *Thelotrema monobacterium* var. *geminipara* Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., Ser. A*, 15 (6): 178 (1921)
- * *Thelotrema leightonii* Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 620 (1923).
- * *Thelotrema massalongoi* ['Massalongii'] (Mont.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 624 (1923)

*Ocellularia meiosperma** (Nyl.) Hale, *Mycotaxon* 11: 137 (1980)

- * *Thelotrema meiospermum* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot. sér.* 4, 19: 333 (1863)
- * *Phacotrema meiospermum* (Nyl.) Müll. Arg., *Flora, Jena* 69: 311 (1886)
- * *Thelotrema subinalbescens* Nyl., *Acta Soc. Sci. Fenn.* 26: 18 (1900)
- * *Verrucaria discissa* Nyl., *Acta Soc. Sci. Fenn.* 26: 25 (1900)
- * *Pyrenula discissa* (Nyl.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 1: 428 (1921)
- * *Thelotrema phaeospermoides* Vain. *Ann. Acad. Sci. Fenn.* 15A: 185 (1921)

* ไหล่น้ำที่หายากหรือพบใหม่ในประเทศไทย (new records)

** ไหล่น้ำชนิดใหม่ (probable new species)

C ไหล่น้ำที่หายากจากใต้พุ่มไม้เรือนยอด (canopy lichens)

- * *Phaeotrema phaeospermoides* (Vain.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 609 (1923)
- * *Phaeotrema subinalbescent* (Nyl.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 610 (1923)
- Ocellularia neopertusariformis** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 315 (1981)
- Ocellularia papillata** (Leight) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 597 (1923)
 - * *Thelotrema papillatum* Leight., *Trans. Linn. Soc. London* 27: 169 (1870)
- Ocellularia peremergens*** Homchantara & Coppings, *Lichenologist* 34 (2): 133–140.
- Ocellularia perforata** (Leight.) Müll. Arg., *Hedwigia* 31: 284 (1892)
 - * *Thelotrema perforatum* Leight., *Trans. Linn. Soc. London* 25: 447 (1886)
- Ocellularia pluripora** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 319 (1981)
- Ocellularia punctulata** (Leight) Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 599 (1923)
 - * *Ascidium punctulatum* Leight., *Trans. Linn. Soc. London* 27: 171 (1870)
- Ocellularia sticticans** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 323 (1981)
- Ocellularia terebrata** (Ach.) Müll. Arg., *Flora* 70: 398 (1887)
 - * *Thelotrema terebratum* Ach., *Kongl. Vetensk. Acad. Nya Handl.* 33: 88 (1812)
- Ocellularia wolseleyana*** Homchantara & Coppings, *Lichenologist* 34 (2): 133–140.
- Ochrolechia* sp. 1^c In Purvis and et al. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 398
- Parmeliella brisbanensis** (C. Knight) M. Jørg. & D. J. Galloway, *Fl. Australia* 54: 316 (1992)
 - * *Pannaria brisbanensis* C. Knight. *Proc. Roy. Soc. Queensland* 6: 194 (1890)
- Parmeliella mariana** (Fr.) M. Jørg. & D. J. Galloway, *Fl. Australia* 54: 316 (1992)
 - * *Parmelia mariana* Fr., *Syst. Orb. Veg.* 1: 284 (1825)
 - * *Pannaria mariana* (Fr.) Müll. Arg., *Flora* 60: 321 (1887)
 - * *Pannaria funebris* Kremp., *J. Mus. Godeffroy* 1 (4): 101, t. 14, fig 13 (1874)

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่เคยพบที่ไหน (probable new species)

^c ไม่เคยมีรายงานการพบบนต้นไม้หรือหิน (canopy lichens)

- Parmeliella nigrata** (Müll. Arg.) M. Jorg. & D. J. Galloway, *Fl. Australia* 54: 317 (1992).
- ✦ *Pannaria nigrata* Müll. Arg., *Bull. Herb. Boissier* 4: 91 (1896)
- Parmelinella chozoubae*^C (Kr. P. Singh & G. P. Sinha) Elix & Pooprang, *Mycotaxon* 71: 115 (1998)
- ✦ *Parmelia chozoubae* Kr. P. Singh & G. P. Sinha, *Nordic. J. Bot.* 13 (4): 463 (1993)
- Parmelinella wallichiana*^C (Taylor) Elix & Hale, *Mycotaxon* 29: 242 (1987)
- ✦ *Parmelia wallichiana* Taylor, *London J. Bot.* 6: 176 (1847)
- Parmelinella* sp. 1^C Elix, J.A. 1994 . *Parmeliaceae, Key to Genera in Flora of Australia* 55: 5–6.
- Parmelinopsis expallida* (Kurok.) Elix & Hale, *Mycotaxon* 29: 242 (1987)
- ✦ *Parmelia expallida* Kurok., *Bull. Nat. Sc. Mus., Tokyo* 11: 191 (1968)
- Parmelinopsis jamesii** (Hale) Elix & Hale, *Mycotaxon* 29: 242 (1987)
- ✦ *Parmelina jamesii* (Hale) Hale, *Phytologia* 23: 179 (1972)
- Parmelinopsis microlobulata* (Awat.) Elix & Hale, *Mycotaxon* 29: 233–244 (1987)
- ✦ *Parmelia microlobulata* Awat., *Biological Memoirs* 1: 182 (1977)
- Parmotrema cristiferum*^C (Taylor) Hale, *Phytologia* 28: 335 (1974)
- ✦ *Parmelia cristifera* Taylor, *London J. Bot.* 6: 165 (1847)
- Parmotrema euplectinum*** Elix, Noicharoen & P. Wolsaley, *Mycotaxon* 85: 325–330
- Parmotrema explanatum*^C (Hale) Hale, *Phytologia* 28: 337 (1974)
- ✦ *Parmelia explanata* Hale, *Journ. Jap. Bot.* 40: 199 (1964)
- Parmotrema gardneri*^C (C. W. Dodge) Sérus., *Bryologist* 87: 5 (1984)
- ✦ *Parmelia gardneri* C. W. Dodge, *Ann. Missouri Bot. Gard.* 46: 179 (1959)
- Parmotrema merillii*^{C*} (Vain.) Hale, *Contr. U. S. Natl. Herb.* 36: 298 (1965)
- ✦ *Parmelia merillii* Vainio, *Philipp. J. Sci.* 4: 658 (1909)
- Parmotrema overeemii*^C (Zahlbr.) Elix, *Aust. Lich.* 43: 23 (1998)
- ✦ *Parmelia overeemii* Zahlbr., *Ann. Crypt. Exot.* 1: 204 (1928)
- Parmotrema permutatum** (Stirt.) Hale, *Phytologia* 28: 338 (1974)
- ✦ *Parmelia permutata* Stirt., *Scott. Naturalist (Perth)* 4: 252 (1877–1878)

* ไหลหินที่รายงานการพบในบริเวณใหม่ (new records)

** ไหลหินชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไหลหินที่รายงานพบเฉพาะบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Parmotrema planatilobum* (Hale) Hale, *Phytologia* 28: 338 (1974)
- * *Parmelia planatilobata* Hale, *J. Jap. Bot.* 40: 200 (1964)
- Parmotrema platyphyllum* (Vain.) Elix, *Australasian Lichenology* 42: 22–27
- * *Parmelia platyphylla* Vain. *Boyanisk Tidsskrift Kjobenhavn* 29: 106 (1909)
- Parmotrema poolii*^C (C. W. Dodge) Krog & Swinscow, *Lichenologist* 15:130 (1983)
- * *Parmelia poolii* C. W. Dodge, *Ann. Missouri Bot. Gard* 46: 146 (1959)
- Parmotrema praesorediosum*^C (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 338 (1974)
- * *Parmelia praesorediosa* Nyl., *Sert. Lich. Trop.* 18 (1891)
- Parmotrema pseudocritinum*^{*} (Abbayes) Hale, *Phytologia* 28: 338 (1974)
- * *Parmelia pseudocritina* Abbayes, *Bull. Inst. fr. Afr. noire A*, 20: 19 (1958)
- Parmotrema rampoddense* (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 338 (1974)
- * *Parmelia rampoddensis* Nyl., *Acta Soc. Sci. Fenn.* 26: 7 (1900)
- Parmotrema rubomarginatum*^C Elix & Pooprang, *Mycotaxon* 72: 115 (1999)
- Parmotrema saccatilobum* (Taylor) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- * *Parmelia saccatiliba* Taylor, *London J. Bot.* 6: 174 (1847)
- Parmotrema sancti-angelii*^C (Lyng.) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- * *Parmelia sancti-angelii* Lyng., *Ark. Bot.* 13: 35 (1914)
- Parmotrema subarnoldii* (Abbayes) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- * *Parmelia subarnoldii* Abbayes, *Mém. Inst. Sci. Madagascar, sér. B. Biol. Vég.* 10: 113 (1961)
- Parmotrema sulphuratum*^C (Nees & Flot.) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- * *Parmelia sulphurata* Nees & Flot., *Linnaea* 9: 501 (1835)
- Parmotrema tinctorum*^C (Despr. ex Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- * *Parmelia tinctorum* Despr. ex Nyl., *Flora* 55: 547 (1872)
- Parmotrema zollingerii*^C (Hepp) Hale, *Phytologia* 28: 339 (1974)
- Parmotrema* sp. 1^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*: 159–164
- Pertusaria* sp. 1^C In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and SriLanka. *Bibl. Liche.* 40: 209

* ไม่นับเป็นรายงานการพบใหม่ในประเทศไทย (new records)
 ** ไม่นับเป็นสปีชีส์ใหม่ (probable new species)
^C ไม่นับเป็นรายงานจากการพบบนใบไม้ในร่ม (canopy lichens)

Phaeographina caesiopruinosa^C (Fée) Müll. Arg. *Memoir Soc. Phys. Hist. Nat. Genève*, 29 (8): 49 (1887)

- * *Arthonia caesiopruinosa* Fée, *Suppl. Essai Crypt. Ecorces* 36, pl. 40, fig. 4 (1837)
- * *Graphis colubrosa* Nyl. *Annls. Sci. Nat. Bot. Ser* 5 (7): 332 (1867)
- * *Phaeographina colubrosa* (Fée) Müll. Arg. *Flora*, 65: 400 (1882)

*Phaeographina caesioradians** (Leight.) Redgr. *Ark. F. Bot.* 26 A (1): 99 (1933)

- * *Graphis caesioradians* Leight. *Trans. Linn. Soc. Lond.* 27: 176 (1869)
- * *Graphis cirrhata* Stirt. *Proc. Phil. Soc. Glasgow*, 13: 186 (1881)
- * *Graphina caesioradians* Müll. Arg., *Zahlbr., Catal. Lich. Univ.* 2: 399 (1924)
- * *Phaeographina cirrhata* Zahlbr. *Catal. Lich. Univ.* 2: 399 (1924)
- * *Phaeographina asteroides* Fink, *N. Sp. Lich. Porto Rico in Mycologia* 19: 219 (1927)
- * *Phaeographina caesiopruinosella* Fink, *N. Sp. Lich. Porto Rico in Mycologia* 19: 220 (1927)

Phaeographina chapadana^{C*} Redgr. *Ark. Bot.* 27A (3): 1–103 (1935)

Phaeographina chlorocarpoides^C (Nyl.) Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 321 (1924)

- * *Graphis chlorocarpoides* Nyl., *Flora* 49: 133 (1866)
- * *Phaeographina pyrrhocroa* Auct. Non Mont, Nakanishi, *Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 2* (11): 103 (1966)

Phaeographina echinocarpica^{C*} A. W. Archer & Elix. *Mycotaxon* 72: 91–96 (1999)

*Phaeographina exsertissima** Vain. *Annal. Acad. Sci. Fenn. ser A*, 15 (6) (1921)

*Phaeographina flexuosa** (Nyl.) Müll. Arg. *Journ. Linn. Soc. London* 30: 461 (1895)

- * *Graphis flexuosa* Nyl., *Lich. Japon.* 113 (1890)
- * *Lecanactis flexuosa* Nyl., *Sert. Lich. Trop.* 12 (1891)
- * *Phaeographina sundaica* A. Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 2: 447 (1924)

Phaeographina jambosae^{C*} A. Zahlbr. *Ann. Cryptog. Exot.*, 1: 143 (1928)

Phaeographina montagnei^C (v. d. Bosch) Müll. Arg. *Flora* 65: 399 (1882)

- * *Graphis montagnei* v.d. Bosch apud Jungh., *Plant. Junghuhn.* 4: 472 (1855)

* โคมก้นจานพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** โคมก้นจานใหม่ (probable new species)

^C โคมก้นจานพบตามสภาพบนเรือนยอด (canopy lichens)

- *Lecanactis Montagnei* Nyl. In *Mem. Soc. Sc. Nat. Cherbourg* 5: 134 (1857)
- *Graphina Montagnei* Müll. Arg. in *Flora* 63: 11 (1880)
- *Phaeographina macrospora* (Zahlbr.) Nakanishi, *Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 2* (11): 101 (1966)

Phaeographina obfirmata^{C*} Zahlbr. *Catalogus lichenum universalis*: 441. (1923)

- *Lecanactis obfirmata* Nyl. & Crombie. *J. Linn. Soc., Bot.* 20: 48–69. (1884)

Phaeographina pudica^{C*} (Mont. et v.d. Bosch) Zahlbr. *Ann. Cryptog. Exot.* 1: 142 (1928)

- *Graphis pudica* Mont. et v.d. Bosch apud Jungh., *Plant. Junghuhn.* 4: 474 (1855)
- *Graphina pudica* A. Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 2: 421 (1924)

Phaeographina quassiaecola (Fée) Müll. Arg. *Memoir. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève* 29: 47 (1887)

- *Fissurina quassiaecola* Fée, *Essai Cryptog. Ecorc. Offic.* 97 (1824)
- *Graphis quassiaecola* Wain. In *Ann. Acad. Sc. Fenn. Ser. A 15/nr.* 6: 197 (1921)
- *Opegrapha crassilabra* Mont., *Sylloge Gen. Spec. Crypt.* 348 (1856)
- *Graphis grisea* Nyl. In *Hue, Nouv. Arch. Mus.* 3 (3): 164, (1891)
- *Phaeographis crassilabra* A. Zahlbr. in *Ann. Cryptog. Exot.* 1: 132 (1928)
- *Phaeographina grisea* Zahlbr. *Catal. Lich. Univ.* 2: 439 (1924)

Phaeographina reticulata^{*} (Fée) Müll. Arg. *Lich. Beitr. in Flora* 65: 399 (1882)

- *Platygramma reticulata* Fée, *Matér. Lich. Brésil in Bull. Soc. Bot. France* 21 (1874)
- *Phaeographina caesiopruinosa* var. *reticulata* Müll. Arg., *Graph. Fécan. In Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève* 29/nr. 8: 49 (1887)

Phaeographina sp. 1 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

Phaeographina sp. 2 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่น่าจะมีถิ่นใหม่ (probable new species)

^C ไม่น่าจะมีรายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Phaeographina* sp. 3 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographina* sp. 4 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographina* sp. 5 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis aulaxerpeta** (Leight.) Müll. Arg., *Flora* 65: 382 (1882)
- *Platygrapha aulaxerpata* Leight. in *Trans. Linn. Soc. London* 27: 179 (1869)
- Phaeographis ceratoides** (Vain.) Zahlbr., *Catal. lich. univ.* 2: 365 (1924)
- *Graphis ceratoides* Vain. in *Ann. Acad. Sc. Fenn., ser. A 15/nr.* 6: 227 (1921)
- Phaeographis circumscripta** (Krph.) Zahlbr., *Catal. Lich. univ.* 2: 366 (1924)
- *Graphis circumscripta* Krph. in *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 7: 62 (1875)
- Phaeographis dendroides** (Leight.) Müll. Arg., *Flora* 65: 208. (1882)
- *Platygrapha dendroides* Leight. in *Transact. Linn. Soc. London* 27: 179, p 36. (1869)
 - *Graphis dendroides* Vain. *Ann. Acad. Sc. Fenn., ser. A 15/nr.* 6 : 221. (1921)
- Phaeographis exaltata** (Mont. et v.d. Bosch.) Müll. Arg., *Flora* 65: 336. (1882)
- *Lecanactis exaltata* Mont. et v.d. Bosch in *Jungh., Pl. Junghuhn.*, 4: 475. (1855)
 - *Solenographa confluens* Mass. *Apud Krph. In Verhandl. Zool.-bot. Ges. Wien* 21: 866 (1871)
- Phaeographis extrusa** (Stirt.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 372 (1924)
- *Graphis extrusa* Stirt. in *Proc. Phil. Soc. Glasgow*, 13: 187 (1881)
- Phaeographis inustoides** Fink. *Mycologia* 19: 215. (1927)
- *Phaeographis punctiformis* (Eschw.) Müll. Arg. *Ark. Bot.* 27A: 1-103. (1935)

* ไลเคนที่รายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไลเคนชนิดใหม่ (probable new species)

c ไลเคนที่รายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Phaeographis melanostalazans*^{C*} (Leight.) Müll. Arg., *Flora* 65: 336 (1882)
- *Platygrapha melanostalazans* Leight. in *Transact. Linn. Soc. London*, 27: 180. (1869)
- Phaeographis pruinosa*^{*} M. Nakan., *Journal of Science of the Hiroshima University Series B. Div.* 2,11 (1966)
- Phaeographis submaculata*^{*} Zahlbr., *Ann. Mycol.* 30: 433 (1932)
- Phaeographis subtigrina* (Vain.) Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 387 (1923)
- *Graphis subtigrina* Vain. in *Hedwigia* 46: 177 (1907)
- Phaeographis* sp. 1 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 2 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 3 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 4 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 5 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 6 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 7 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 8 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* ไม่นับเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับเป็นชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไม่นับเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทยในร่มเงา (canopy lichens)

- Phaeographis* sp. 9 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 10 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 11 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 12 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 13 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 14 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 15 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 16 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 17 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 18 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Phaeographis* sp. 19 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.

* ไหลหินที่พบจากการพบใหม่/ครั้งแรก (new records)

** ไหลหินชนิดใหม่ (probable new species)

† ไหลหินที่พบตามยอดไม้หรือพุ่มไม้ (canopy lichens)

- Phaeographis* sp. 20 In Wirth, M. and M. E. Hale. 1978. Modern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Graphidaceae). *Smithsonian Contr. Bot.* No. 4.
- Physcia erumpens** Moberg, *Nord. J. Bot.* 6: 856 (1986)
- Physcia integrata** Nyl., *Syn. Lich.* 1 (2): 424 (1860)
- Physcidia wrightii*^c Tuck., *Proc. Am. Acad. Arts.* 5: 400 (1862)
- Physma byrsaceum*^{c*} (Ach.) Tuck., *Syn. N. Am. Lich.* 1: 115 (1882)
- ✱ *Parmelia byrsaea* Ach., *Meth. Lich.* : 222 (1803)
- Placopsis* sp. 1^c In Purvis, O.W., B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. and D. M. Moore. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 474
- Placynthiella* sp. 1 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 2 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 3 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 4 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 5 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 6 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 7 In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Placynthiella* sp. 8^c In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 79–83
- Polymeridium albidum** (Müll. Arg.) R. C. Harris, *Acta Amazonica* 14 (1–2, Supl.): 69. (1984)
- ✱ *Arthopyrenia albida* Müll. Arg., *Flora* 67: 664. (1884)
- ✱ *Arthopyrenia siamensis* Vainio, *Ann. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo* 1 (3): 55. (1921)
- ✱ *Arthopyrenia obvelata* Vainio, *Ann Acad. Sci. Fenn. ser. A.*, 19 (15): 11. (1923)

* ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย (new records)

** ไม่ทราบชนิดใหม่ (probable new species)

^c ไลเคนที่ขึ้นตามกิ่งก้านของต้นไม้บริเวณยอด (canopy lichens)

*Polymeridium albocinereum** (Krempelh.) R. C. Harris., *Bol. Mus. Para. Emilio Goeldi, sér. bot.* 7 (2) (1991)

- *Arthopyrenia* (sect. *Polymeridium*) *pleiomerella* Müll. Arg., *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 406. (1885)

Verrucaria albocinerea Krempelh., *Flora* 59: 524. (1876)

*Polymeridium catapastum** (Nyl.) R. C. Harris., *Acta Amazonica* 14 (1/2, Supl.): 70. (1984)

- *Arthopyrenia stramineoatra* Vainio, *Étud. class. lich. Brésil* 2: 234. (1890)
- *Arthopyrenia tumida* Müll. Arg., *Flora* 67: 669. (1884)
- *Verrucaria suffusa* Knight, *Trans. Proc. New Zealand Inst.* 15: 356, pl. 36, f. 12. (1882)
- *Verrucaria subvirescens* Leighton, *Trans. Linn. Soc. London* 25: 488, pl. 56, f. 25. (1866)
- *Verrucaria catapastum* Nyl., *Acta Soc. Sci. Fenn.* 7: 488. (1863)

*Polymeridium quinqueseptatum** (Nyl.) R. C. Harris in Tucker & Harris, *Bryologist* 83: 12. (1980)

- *Pseudopyrenula* (sect. *Heterothelium*) *polyphragmia* Vainio, *Bol. Soc. Brot. sér. 2*, 6: 178. (1930)
- *Arthopyrenia* (sect. *Polymeridium*) *comparatula* Müll. Arg., *bot. Jahrb. Syst.* 6: 406. (1885)
- *Verrucaria pustulosa* Stirton, *Proc. Roy. Phils. Soc. Glasgow* 13: 191. (1881)
- *Verrucaria quinqueseptata* Nyl., *Expos. syn. pyrenocarp.* 58. (1858)

Polymeridium sp. 1^c In Harris, R. C. 1991. A reversion of *Polymeridium* (Müll. Arg.) R. C. Harris (Trypetheliaceae). *Boletim do Museu Paraense "Emilio Goeldi", serie Botanica* 7: 621

Pseudopyrenula diluta var. *degenerans* Vainio., *Bot. Tidskr.* 29: 148 (1909)

Pyrenula sp. 1^c In Awasthi, D. D. 1991. A key to the Microlichens of India, Nepal and Sri Lanka. *Bibl. Liche.* 40: 249

Pyrrospora sp. 1 In Purvis, O.W., B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. and D. M. Moore. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 523

Pyrrospora sp. 2^c In Purvis, O.W., B. J. Coppins, D. L. Hawksworth, P. W. and D. M. Moore. 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland.*: 523

* ไมโครลิเคินจากการพบใหม่ในประเทศไทย (new records)

** ไมโครลิเคินใหม่ (probable new species)

^c ไมโครลิเคินที่มาจากธรรมชาติบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Pyxine berteriana*^C* (Fée) Imsh., *Trans. Amer. Microscop. Soc.* 56: 254 (1957)
- ✦ *Circinaria berteriana* Fée, *Essai Crypt.*: 128 (1824)
- Pyxine coccifera*^C (Fée) Nyl., *Mém. Soc. natn. Sci. nat. math. Cherbourg* 5: 108 (1857)
- Pyxine cocoes** (Swartz) Nyl., *Mém. Soc. natn. Sci. nat. mat.* 5: 108 (1857)
- ✦ *Lichen cocoes* Swartz, *Nov. Gen. Sp. Pl.*: 146 (1788)
- Pyxine consocians* Vainio, *Philipp. J. Sci. Sect. C.*, 8: 109 (1913)
- Pyxine convexior*^C* (Müll. Arg.) Swinscow & Krog, *Norw. J. Bot.* 22: 52 (1975)
- ✦ *Pyxine cocox* var. *convexior* Müll. Arg., *Bot. Jb.* 20: 262 (1894)
- Pyxine copelandii** Vainio, *Philipp. J. Sci. Sect. C.*, 8: 110 (1913)
- Pyxine coralligera*^C Malme, *Bihang K. svenska VetenskAkad. Handl.* 23 (3): 40 (1897)
- Pyxine maculata*^C* Swinscow & Krog, *Norw. J. Bot.* 22: 58 (1975)
- Pyxine meissnerina* Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normandie, Sér.* 2 (7): 164 (1873)
- Pyxine obscurascens*^C* Malme, *Bihang K. svenka VetenskAkad. Handl.* 23 (3): 42 (1897)
- Pyxine* cf. *rhodesiaca*^C* Lyngé, *Revue Bryol. Lichén.* 10 (N. S.): 90 (1937)
- Pyxine soledata** (Ach.) Mont. in Sagra, *Hist. Cuba* 9: 188 (1842)
- ✦ *Lecidia soledata* Ach., *Syn. Lich.*: 54 (1814)
- Pyxine subcinerea** Striction, *Trans. Proc. New Zealand Inst.* 30: 397 (1898)
- Pyxine veriformis*^C* Swinscow & Krog, *Norw. J. Bot.* 22: 66 (1975)
- Pyxine* sp. 1^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*
- Pyxine* sp. 2^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*
- Pyxine* sp. 3^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa*
- Ramalina* cf. *fimbriata*^C* Swinscow & Krog, *Norw. J. Bot.* 21: 117 (1974)
- Ramalina inflata* subsp. *perpusilla** (Stirt.) G. N. Stevens, *Bull. Brit. Mus.* 16 (2): 188 (1987)
- ✦ *Ramalina minuscula* var. *alba* C. Knight ex Shirley, *Proc. R. Soc. Qd* 5: 103 (1888)

* ไลเคนที่รายงานจากการพบในประเทศไทย (new records)

** ไลเคนชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไลเคนที่รายงานจากการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Ramalina nervulosa* var. *nervulosa** Müll. Arg. *Bull. Inst. Afr. noire* 14: 25 (1952)
- ✦ *Ramalina farinacea* var. *nervulosa* Müll. Arg., *Flora, Jena* 66: 21 (1883)
- Ramalina pacifica* Asahina, *J. Jap. Bot.* 15: 213 (1939)
- ✦ *Ramalina insularum* H. Magn., *Ark. Bot.* 3 (10): 361 (1956)
- Relicina abstrusa*^C (Vain.) Hale, *Phytologia* 28: 484 (1974)
- ✦ *Parmelia abstrusa* Vain., *Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.* 7: 64 (1890)
- Relicina circumnodata*^{C*} (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 484 (1974)
- ✦ *Parmelia circumnodata* Nyl. in W. Nylander & J. M. M. Crombie, *J. Linn. Soc., Bot.* 20: 51 (1883)
- Relicina conivens*^{C*} (Kurok.) Hale, *Phytologia* 28: 484 (1974)
- ✦ *Parmelia conivens* Kurok., *Contr. U. S. Natl Herb.* 36: 142 (1964)
- Relicina palmata*^{C*} Elix, *Biblio. Lich.* 2: 83 (1996)
- Relicina relicinula*^{C*} (Müll. Arg.) Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 26: 27 (1975)
- ✦ *Parmelia relicinula* Müll. Arg., *Flora* 65: 317 (1882)
- Relicina subabstrusa*^C (Gyeln.) Hale, *Phytologia* 28: 485 (1974)
- ✦ *Parmelia substrusa* Gyeln., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 29: 288 (1931)
 - ✦ *Parmelia limbata* f. *endococcinea* Müll. Arg., *Flora* 70: 318 (1887)
 - ✦ *Parmelia endococcinea* (Müll. Arg.) Gyeln., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 29: 288 (1931)
 - ✦ *Parmelia decaryana* Gyeln., *Repert. Spec. Nov. Regni Veg.* 36: 153 (1934)
- Relicina subconivens*^{C*} Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 26: 30 (1975)
- Relicina sublimbata* (Nyl.) Hale, *Phytologia* 28: 485 (1974)
- ✦ *Parmelia sublimbata* Nyl., *Flora* 68: 615 (1885)
- Relicina polycarpa* sp. nov. Elix & Polyiam, *Mycotaxon* 85: 325–330 (2003)
- Relicinopsis intertexta*^C (Mont. & Bosch) Elix & Verdon in J. A. Elix, J. Johnston & D. Verdon, *Mycotaxon* 27: 281 (1986)
- ✦ *Parmelia ecoronata* Nyl., *Bull. Soc. Linn. Normandie, Sér. 2* (7): 64 (1873)
 - ✦ *Parmelia gracilis* Müll. Arg. *Flora* 70: 317 (1887)
 - ✦ *Parmelia subrupta* Nyl. in W. Nylander & J. M. M. Crombie, *J. Linn. Soc., Bot.* 20: 51 (1883)

* ไม่นับเป็นการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับเป็นสปีชีส์ใหม่ (probable new species)

^C ไม่นับเป็นการพบครั้งแรกบนเรือนยอด (canopy lichens)

- ✦ *Pseudoparmelia intertexta* (Mont. & Bosch) Hale, *Phytologia* 29: 190 (1974)
- Reliccinopsis malaccensis*^C (Nyl.) Elix & Verdon in J. A. Elix, J. Johnston & D. Verdon, *Mycotaxon* 27: 282 (1986)
- ✦ *Parmelia malaccensis* Nyl. in W. Nylander & J. M. M. Crombie, *J. Linn. Soc., Bot.* 20: 52 (1883)
- ✦ *Pseudoparmelia malaccensis* (Nyl.) Hale, *Phytologia* 29: 190 (1974)
- Reliccinopsis rahengensis*^C (Vain.) Elix & Verdon in J. A. Elix, J. Johnston & D. Verdon, *Mycotaxon* 27: 282 (1986)
- ✦ *Parmelia rahengensis* Vain. *Ann. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo* 1: 39 (1921)
- ✦ *Pseudoparmelia rahengensis* (Vain.) Hale, *Phytologia* 29: 191 (1974)
- Rimelia reticulata*^C (Taylor) Hale & A. Fletcher, *Bryologist* 93: 28 (1990)
- ✦ *Parmelia reticulata* Taylor in J. T. Mackay, *Fl. Hibern.* 2: 148 (1836)
- ✦ *Parmotrema reticulata* (Taylor.) M. Choisy, *Bull. Mens. Soc. Linn. Soc. Bot. Lyon* 21: 175 (1952)
- ✦ *Parmelia concors* Kremp., *Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien* 30: 337 (1880)
- ✦ *Parmelia urceolata* var. *subcetrata* Müll. Arg., *Flora* 66: 45 (1883)
- Rinodina dissa** (Stirt.) Mayrh., *Beih. Nova Hedwigia* 79: 532 (1984)
- ✦ *Lecidea dissa* Stirt., *Trans. Glasgow Soc. Field Naturalist* 4: 94 (1875)
- Sarcographa actinobola*^{C*} (Nyl.) Müll. Arg., *Catal. Lich. univ.* 2: 458 (1924)
- ✦ *Glyphis actinobola* Nyl., *Lich. Nov. Granat. Prodr.* In *Ann. Sc. Nat., Ser.* 4 (20): 239 (1863)
- Sarcographa cuyabensis** Redgr., *Ark. Bot.* 27A (3): 1-103 (1935)
- Sarcographa intricans** (Nyl.) Müll. Arg., *Flora* 70: 77 (1887)
- ✦ *Graphis intricans* Nyl., *Acta Soc. Sci. fenn.* 7: 473 (1863)
- Sarcographa labyrinthica** (Ach.) Müll. Arg. *Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève* 29 (8): 62 (1887)
- ✦ *Glyphis labyrinthica* Ach., *Syn. Lich.*: 107 (1814)
- ✦ *Sarcographa colliculosa* (C. Knight) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 459 (1924)
- ✦ *Glyphis colliculosa* C. Knight in F.M. Bailey, *Syn. Queensland Flora, First Supplement*: 75 (1886)

* ไหลน้ำรินตามแนวชายฝั่งในทะเลอันดามัน (new records)

** ไหลน้ำรินชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไหลน้ำรินตามแนวชายฝั่งบนเกาะในเขตป่าดิบชื้น (canopy lichens)

- * *Glyphis kirtonianiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Flora* 70: 77 (1887)
- * *Glyphis kirtonianiana* Müll. Arg., *Flora* 65: 516 (1882)
- * *Sarcographa actinota* F. Wilson, in F.M. Bailey, *Bot. Bull. s. n.* (2), *Queensland Dept. Agric. Bull.* 7: 33 (1891)

Sarcographa maculosa^C* (Stirton) Zahlbr

Sarcographa sp. 1^C

Sarcographina glyphiza^C* (Nyl.) K. Singh & D.D. Awasth, *Bull. Bot. Surv. India* 20 : 139 (1978)

- * *Graphis glyphiza* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot. Ser.* 4 (19): 374 (1863)
- * *Phaeographina glyphiza* (Nyl.) Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 2: 373 (1924)
- * *Glyphis gyrizans* Leight. in *Trans. Linn. Soc. Lond.* 27: 161 (1869)
- * *Sarcographa gyrizans* Müll. Arg., *Flora* 70: 77 (1887)
- * *Sarcographa gyrizans* (Leight.) Müll. Arg. *Hedwigia* 30: 187 (1891)

Sarcographina sp. 1

Sticta cyphellulata^{*} (Müll. Arg.) Hue, *Nouv. Archs Mus. Hist. Nat. Paris, Sér.* 4 (3): 99 (1901)

- * *Sticta cyphellulata* Müll. Arg., *Flora, Jena* 65: 301 (1882)

Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach., *Meth. Lich.* : 280 (1803)

- * *Lobaria fuliginosa* Hoffm., *Dtsch. Fl.* 2: 109 (1796)

Sticta orbicularis^C* (Braun) Hue, *Annls Jard. Bot. Buitenz* 17: 193 (1901)

- * *Sticta filicina* var. *orbicularis* Braun, in Meyen & Flotow, *Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.* 19 (suppl.) : 215 (1843)

Sticta weigelii var. *xanthotropa*^C* (Kremp.) Hue, *Nouv. Archs Mus. Hist. Nat., Paris, Sér.* 4 (3): 96 (1901)

- * *Sticta quercizans* var. *xanthotropa* Kremp., *Flora, Jena* 59: 62 (1876)

Trapelia sp. 1^C In Rogers, R. W. 1992. Key to Australian Lichen Genera. In *Flora of Australia* 54: 82

Tephomela atra^C (Huds.) Haffeller in K. Kalb, *Lich. Neotrop. Exsicc.*, 815: 297 (1983)

- * *Lecanora subimmersa* Müll. Arg., *Hedwigia* 32: 124 (1893)
- * *Lecanora atra* var. *serialis* Müll. Arg., *Bull. Herb. Boissier* 3: 632 (1895)
- * *Lecanora brisbanensis* Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 5: 400 (1928)

* ไม่นับเป็นรายงานพบใหม่ในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับเป็นสปีชีส์ใหม่ (probable new species)

^C ไม่นับเป็นรายงานการพบขึ้นเรือนยอด (canopy lichens)

- Thelotrema alboannuliforme* Nagarkar, Sethy & Patw., *Kavaka* 12 (2): 57–62 (1985)
- Thelotrema alborosellum** (Nyl) Tuck., *Gen. Lich.* 139 (1872)
- *Graphis alborosella* Nyl., *Ann. Sci. Nat. Bot.* 4 (19): 372 (1863)
 - *Ocellularia alborosella* (Nyl.) R. Sant., *Symb. Bot. Upsal.* 12 (1): 308 (1952)
- Thelotrema astroideum* (Berk. & Broome) Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 253 (1981)
- *Platygrapha astroidea* Berk. & Broome, *J. Linn. Soc., Bot.* 14: 109 (1875)
- Thelotrema colobicum* Nyl., *Bull. Soc. Lin. Normandie sér.* 2 (7): 169 (1873)
- *Thelotrema deightonii* C. W. Dodge, *Beih. Nova Hedwigia* 12: 100 (1964)
- Thelotrema laceratulum* Müll.Arg., *Flora, Jena* 70: 399 (1887); Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 619 (1923); and Patw. & C. R. Kulk., *Kavaka* 5: 12 (1977)
- Thelotrema lepademersum* Nagarkar, Sethy & Patw., *Kavaka* 12 (2): 59 (1985)
- Thelotrema nurelium** Hale, *Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot.* 8 (3): 261 (1981)
- Thelotrema phlyctidioides* (Müll.Arg.) Hale, *Mycotaxon* 11: 132 (1980)
- *Ocellularia phlyctidioides* Müll. Arg., *Hedwigia* 32: 130 (1893)
 - *Ocellularia conglomerata* Hale, *Smithsonian Contr. Bot.* 16: 19 (1974)
- Thelotrema porinoides** Mont. & Bosch in Jungh., *Enum. Pl. Insul. Java Sumatra*: 151 (1855)
- *Ocellularia exanthismocarpa* (Leight.) Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 2: 590 (1924)
- Thelotrema rhododiscum*** Hamchantara & Coppin, *Lichenologist* 34 (2): 113–140.
- Thelotrema turgidulum** (Müll.Arg.) Hale, *Mycotaxon* 11: 132 (1980)
- *Ocellularia turgidula* Müll. Arg., *J. Bot.* 7 (7): 94 (1893)
- Thelotrema* sp. 1^c In Hale, M. E. 1974. Moredern-Smithsonian Expedition to Dominica: The Lichens (Thelotremataceae). *Smithsonian Contr. Bot.* 16: 31
- Trapelia* sp.1 In Purvis and *et al.* 1992. *The Lichen Flora of Great Britain and Ireland*: 610
- Trypethelium albopruinosum** Makhija & Patw., *J. Hattori Bot. Lab.* 73: 193 (1993)
- Trypethelium eluteriae*^c Spreng. *Anleitung. Kenntn. Gewache* 3: 351 (1804)
- *Trypethelium sprengelii* Ach., *Lich. Univ.* 306, pl. 4, f–8. (1810)

* โยคอินวาทนาการพบใหม่ในประเทศไทย (new records)

** โยคอินวาทนาการ (probable new species)

^c โยคอินวาทนาการจากยอดพืชมงคลเรือนยอด (canopy lichens)

*Trypethelium microstomum** Makhija & Patw., *J. Hattori Bot. Lab.* 73: 201 (1993)

*Trypethelium ochroleucum** (Eschw.) Nyl. *Flora* 52: 126 (1869)

• *Ferrucaria ochroleuca* Eschw., *Mart. Icon. Plant. Cryptog.* 16, pl. fig. 3-4 (1828)

• *Trypethelium pallescens* Fée, *Ann. Sci. Nat.* 23: 440, pl. 13 f. 3A-C (1831)

Trypethelium ochroleucum var. *subdissocians** (Vain.) Zahlbr. *Cat. Lich. Univ.* 1: 497 (1922)

• *Pseudopyrenula ochroleuca* var. *subdissocians* Vain., *Bot. Tidskrift* 29: 147 (1909)

• *Trypethelium pallescens* var. *subdissocians* Nyl. *Flora* 47: 618 (1864)

Trypethelium tropicum^c (Ach.) Müll.Arg. *Bot. Jahrb. Syst.* 6: 395 (1885)

• *Ferrucaria tropica* Ach., *Lich. Univ.* 278 (1810)

Trypethelium sp. 1 In Makhija, U., and P. G. Patwardhan. 1993. A contribution to our knowledge of the lichen genus *Trypethelium* (family Trypetheliaceae). *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 73: 183-219.

Trypethelium sp. 2 In Makhija, U., and P. G. Patwardhan. 1993. A contribution to our knowledge of the lichen genus *Trypethelium* (family Trypetheliaceae). *Journal of the Hattori Botanical Laboratory* 73: 183-219.

Usnea abyssinica Motyka, *Lich. Gen. Usnea Stud. Monogr., Pars Syst.* 3: 621 (1938)

Usnea baileyi (Stirt.) Zahlbr., *Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl.* 83: 182 (1909)

• *Eumitria baileyi* Stirt., *Scott. Nat.* 6:100 (1881)

Usnea baileyi var. *baileyi* (Stirt.) Zahlbr., *Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl.* 83: 182 (1909)

Usnea baileyi var. *pinnatifida** Swinscow & Krog, *Norw. J. Bot.* 21: 172 (1974)

Usnea bismollascula^c* Zahlbr., *Cat. Lich. Univ.* 6: 542 (1923)

• *Usnea molluscular* Vain., *Bot. Mag. Tokyo* 35: 45 (1921)

Usnea bornmuelleri Steiner, *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 53: 227 (1903)

Usnea complanata (Müll. Arg.) Motyka, *Lich. Gen. Usnea Stud. Monogr. Pars Syst.* 1: 109 (1936)

• *Usnea barbata* var. *strigosa* f. *complanata* Müll. Arg., *Nova Hedwigia* 31: 276 (1892)

* ไม่นับการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับชนิดใหม่ (probable new species)

^c ไม่นับที่พบเฉพาะบนต้นไม้นานาชนิด (canopy lichens)

- Usnea himantodes*^C* Stirt., *Scott. Nat.* 7: 75 (1883)
- Usnea leprosa* Motyka, *Lich. Gen. Usnea Stud. Monogr., Pars Syst.* 1: 106 (1936)
- Usnea perhispidella* Steiner, *Sber. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., Abt. 1* (106): 250 (1879)
- Usnea pulvinulata* C. W. Dodge., *Ann. Mo. bot. Gdn* 43: 392 (1956)
- Usnea rubicunda*^C Stirt., *Scott. Nat.* 6: 102 (1881)
- Usnea subflorida*^C* (Zahlbr.) Motilich *Gen. Usnea Stud. Monogr., Pars Syst.* 2: 335 (1937)
- ♦ *Usnea steineri* var. *subflorida* Zahlbr., *Bot. Jb.* 60: 541 (1926)
- Usnea submollis*^C Steiner, *Verh., zool.-bot. Ges. Wien* 53: 229 (1903)
- Usnea undulata* Stirt., *Scott. Nat.* 6: 104 (1881)
- Usnea* sp. 1^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa.*
- Usnea* sp. 2^C In Swinscow, T. D. V. and H. Krog. 1988. *Macrolichens of East Africa.*

● **บัญชีรายชื่อไลเคนบนใบไม้ทั้งหมดที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่**

- Arthonia cyanea** Müll. Arg. var. *cyanea*, *Flora* 64: 233 (1881)
- ♦ *Arthonia aisolocularis* L. Xviert Taltasse.
- Arthonia lividula** Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15: 309, 1921
- Arthonia ramosii** (Rasanen) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 76 (1952)
- ♦ *Arthoniopsis ramosii* Rasanen
- Arthonia trilocularis** Müll. Arg., *Flora* 64 : 233 (1881)
- Aulaxina microphana** (Vain.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 299 (1952)
- ♦ *Bilimbia microphana* Vain.
- Bacidina* sp. 1**
- Badimia* sp. 1**
- Bulbothrix ventricosa** (Hale & Korok) Hale
- Byssolecania fumosonigricans* (Müll. Arg.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 553 (1952)

* ไลเคนที่รายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไลเคนชนิดใหม่ (probable new species)

^C ไลเคนที่รายงานจากการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

✦ *Patellaria fumosonigricans* Müll. Arg.

*Byssoloma annuum** (Vain.) Thor, Lücking & Matsumoto, *Symb. Bot. Ups.* 32 (3): 29 (2000)

✦ *Bilimbia annua* Vain.

Byssoloma chlorinum (Vain.) Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 8: 233 (1932)

✦ *Pilocarpon chlorinum* Vain.

*Byssoloma fadeniini** Vězda, *Folia Geobot. Phytotax., Praha*, 10: 425 (1975)

*Byssoloma gahavisukanum** Sérus., in Aptroot et al. *Biblioth. Lichenol.* 64: 39 (1997)

*Byssoloma guttiferæ** (Bat. & Peres) R. Lücking & Sérus. in Lücking et al. *Lichenologist* 30: 138 (1998)

✦ *Crocicreomyces guttiferæ* Bat. & Peres

Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vain., *Dansk Bot. Arkiv*, 4: 23 (1926)

✦ *Lecidea leucoblepharum* Nyl.

*Byssoloma subdiscordans** (Nyl.) P. James, *Lichenologist* 5: 126 (1971)

✦ *Chiodecton subdiscordans* Nyl.

Byssoloma tricholomum (Mont.) Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 2: 569 (1923)

✦ *Biatara tricholoma* Mont.

*Calenia depressa** Müll. Arg., *Lichenes Epiphylli Novi* : 4 (1890)

*Calenia leptocarpa** Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15: 163 (1921)

*Calenia thelotremella** Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15: 160 (1921)

Calopadia fusca (Müll. Arg.) Vězda, *Folia Geobot. Phytotax., Praha*, 21: 215 (1986)

✦ *Lopadium fuscum* Müll. Arg.

*Calopadia puiggarii** (Müll. Arg.) Vězda, *Folia Geobot. Phytotax., Praha*, 21: 215 (1986)

✦ *Heterothecium puiggarii* Müll. Arg.

*Caprettia amazonensis** Bat. & H. Maia see Lücking et al., *Lichenologist* 30: 138 (1998)

*Chroodiscus australiensis** Vězda & Lumbsch, in Lumbsch & Vězda, *Nova Hedwigia* 50: 246 (1990)

* ไม่นับการพบครั้งแรกในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับว่าเป็นใหม่ (probable new species)

† ไม่นับการพบจากยอดไม้บนเกาะลันตา (canopy lichens)

- Chroodiscus mirificus* (Kremp.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 311 (1952)
- * *Platygrapha mirifica* Kremp.
- Chroodiscus verrucosus** R. Sant., Lücking & Vězda, in Santesson & Lücking Nord. J. Bot. 19 (in press)
- Coenogonium dilucidum** (Kremp.) Kalb & Lücking, *Bot. Jahrb. Syst.* 122: 32 (2000)
- * *Lecidea dilucida* Kremp.
 - * *Dimerella dilucida* (Kremp.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 394 (1952)
- Coenogonium isidiiferum** (Lücking) Lücking, *Lichenologist*, 32 (in press).
- * *Dimerella isidiifera* Lücking
- Coenogonium luteum** (Dicks.) Kalb & Lücking, *Bot. Jahrb. Syst.* 122: 32 (2000)
- * *Lichen luteus* Dicks., *Fasc. Plant. Crypt. Brit.* 1: 11 (1785)
 - * *Dimerella lutea* (Dicks.) Trevis., *Rendiconti Reale Ist. Lombardo Sci.* 13: 66 (1880)
- Coenogonium subluteum** (Rehm) Kalb & Lücking, *Bot. Jahrb. Syst.* 122: 34 (2000)
- * *Biatorina sublutea* Rehm.
 - * *Dimerella epiphylla* (Müll. Arg.) Malme, *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 395 (1952)
- Coenogonium* sp.*
- Dirinaria* cf. *picta** (Swartz) Clements & Shear
- Echinoplaca pellicula* (Müll. Arg.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 367 (1952)
- * *Arthonia pellicula* Müll. Arg.
- Echinoplaca tetrapla** (Zahlbr.) Lücking
- Enterographa angustissima** (Vain.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 105 (1952)
- * *Chiodecton angustissimum* Vain.
- Eremothecella macrocephala* (R. Sant.) Thor, Lücking & Matsumoto, *Symb. Bot. Ups.* 32 (3): 39 (2000)
- * *Stirtonia macrocephala* R. Sant.
- Eugeniella micrommata** Lücking *et al.* (in press)
- * *Lecanora micrommata* Kremp.
 - * *Bacidia micrommata* (Kremp.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 459 (1952)

* ไม่นับว่ามีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่นับว่ามี (probable new species)

c ไม่นับว่ามีรายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

*Fellhanera angustispora** Lücking, *Trop. Bryol.* 13: 143 (1997)

*Fellhanera bouteillei** (Desm.) Vězda

*Fellhanera emarginata** Lücking, *Tropical Bryol.* 13: 148 (1997)

*Fellhanera lambinonii** (Sérus.) Lücking & Sérus., in Sérusiaux, *Lichenologist* 28: 219 (1996)

✦ *Bacidia lambinonii* Sérus.

*Fellhanera rhipidophylli** (Rehm) Vězda, *Folia Geobot. Phytotax., Praha*, 21: 214 (1986)

✦ *Bilimbia rhipidophylli* Rehm.

*Fellhanera mastothallina** (Vain.) Lücking & Sérus. (in press)

✦ *Bacidia mastothallina* Vain.

✦ *Bacidina mastothallina* (Vain.) Vězda, *Ann. Naturh. Mus. Wien* 99B: 738 (1997)

*Fellhanera subfuscata** Lücking, *Trop. Bryol.* 13: 162 (1997)

Graphis cf. *ceylandica** Zahlbr.

Graphis sp. fl**

*Gyalectidium novoguineense** Sérus.

Lasiosloma arachnoideum (Kremp.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 547 (1952)

✦ *Phlyctis arachnoidea* Kremp.

*Lasiosloma phycophilum** (Vain.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 550 (1952)

✦ *Sporopodium phycophilum* Vain.

*Leptogium cyanescens** (Rabenh.) Korber

*Mazosia dispersa** (Hedr.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 120 (1952)

✦ *Calenia dispersa* Hedr.

Mazosia melanophthalma (Müll. Arg.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 117 (1952)

✦ *Opegrapha melanophthalma* Müll. Arg.

*Mazosia paupercula** (Müll. Arg.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 128 (1952)

✦ *Opegrapha paupercula* Müll. Arg.

*Mazosia phyllosema** (Nyl.) Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 2: 503 (1923)

✦ *Platygrapha phyllosema* Nyl.

* ไมเคิลและเรนาตาพบในประเทศไทย (new records)

** ไมเคิลคิดใหม่ (probable new species)

c ไมเคิลที่รวบรวมจากกุ่มพยอมบริเวณคลอง (canopy lichens)

- Mazosia pseudobambusae** Kalb & Vězda, *Folia Geobot. Phytotax., Praha*, 23: 207 (1988)
- Mazosia rotula** (Mont.) Massal., *Neogenea Lichenum* : 9 (1854)
- ✦ *Strigula rotula* Mont.
- Mazosia* sp. 1**
- Opegrapha vegae** R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 99 (1952)
- Opegrapha velata** (Müll. Arg.) Vain.
- Porina albicera* (Kremp.) van Overeem-de Haas, see Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 188 (1998)
- ✦ *Verrucaria albicera* Kremp.
- Porina atriceps** (Vain.) Vain., see Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 189 (1998)
- ✦ *Porina epiphylla* var. *atriceps* Vain.
- Porina atrocoerulea** Müll. Arg., *Flora* 66: 336 (1883)
- Porina atropunctata** Lücking & Vězda, Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 192 (1998)
- Porina conica* R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 232 (1952); Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 193 (1998)
- Porina cupreola** (Müll. Arg.) F. Schill. var. *cupreola*, *Hedwigia* 67: 274 (1927)
- ✦ *Phylloporina cupreola* Müll. Arg.
- Porina epiphylla* (Fée) Fée, see Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 199 (1998)
- ✦ *Porina americana* var. *epiphylla* Fée
- Porina fulvella** Müll. Arg., *Flora* 66: 335 (1883)
- Porina hoehneltiana** (Jaap) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 262 (1952)
- ✦ *Calonectria hoehneltiana* Jaap.
- Porina kamerunensis** F. Schill., *Hedwigia* 67: 289 (1927)
- Porina leptosperma* Müll. Arg., *Flora* 66: 333 (1883)
- Porina lucida* R. Sant. var. *lucida*, *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 240 (1952); Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 208 (1998)
- Porina minutissima** Henssen, Lücking & Vězda in Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 211 (1998)

* ไมโครอิมเพกนาตารูปใหม่ในประเทศไทย (new records)

** ไมโครอิมเพกนาตารูปใหม่ (probable new species)

c ไมโครอิมเพกนาตารูปใหม่ที่หายาก (scarce lichens)

- Porina multiloculata** Makhija, Adawadkar & Patwardhan, *J. Econ. Tax. Bot.* 18: 540 (1994)
- Porina nitidula** Müll. Arg., *Flora* 66: 336 (1883)
- Porina octomera* (Müll. Arg.) F. Schill., *Hedwigia* 67: 274 (1927)
- ✦ *Phylloporina octomera* Müll. Arg.
- Porina palmicola** Malcolm & Vězda (in press)
- Porina perminuta** Vain., *Univ. Calif. Publ. Bot.* 12: 14 (1924)
- Porina rubentior** (Stirt.) Müll. Arg., *Flora* 66: 334 (1883); Lücking, *Bot. Acta* 109: 259 (1996)
- ✦ *Verrucaria rubentior* Stirt.
- Porina rufula* (Kremp.) Vain., see Lücking, *Bot. Acta* 109: 259 (1996)
- ✦ *Verrucaria rufula* Kremp.
- Porina sphaerocephala** Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15: 368 (1921)
- Porina subnucula** Lücking & Vězda, *Willdenowia* 38: 217 (1998)
- Porina subrubrosphaera** Kurokawa, *J. Jap. Bot.* 33: 206 (1958)
- Porina tetramera** (Malme) R. Sant., in *Thorold, J. Ecol.* 40: 129 (1952)
- ✦ *Phylloporina tetramera* Malme.
- Porina trichothelioides** R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 227 (1952)
- Porina virescens* (Kremp.) Müll. Arg., see Lücking & Vězda, *Willdenowia* 28: 219 (1998)
- ✦ *Verrucaria virescens* Kremp.
- Porina* sp. 1**
- Porina* sp. 2**
- Sporopodium argillaceum** (Müll. Arg.) Zahlbr., *Catal. Lich. Univ.* 2: 679 (1924)
- ✦ *Gyalectidium argillaceum* Müll. Arg.
- Sporopodium phyllocharis** (Mont.) Massal., *Alcuni Generi di Licheni* : 9 (1855)
- 21 (1): 98 (1997); Lücking, *Nova Hedwigia* 66: 386 (1998)
- ✦ *Biatora phyllocharis* Mont.
- Sporopodium* sp. 1**
- Strigula concreta** (Fée) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 177 (1952)
- ✦ *Craspedon concretum* Fée

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่ทราบชนิดไทย (probable new species)

° ไม่เคยมีรายงานการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)

- Strigula maculata* (Cooke & Massee) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 186 (1952)
- ✦ *Micropeltis maculata* Cooke & Massee
- Strigula melanobapha* (Kremp.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 188 (1952)
- ✦ *Verrucaria melanobapha* Kremp.
- Strigula nitidula** Mont. in Sagra, Sagra, *Histoire de l'île de Cuba* 9: 184 (1838–1842)
- Strigula obducta** (Müll. Arg.) R. C. Harris, *More Florida Lichens* : 158 (1995)
- ✦ *Phylloporina obducta* Müll. Arg.
- Strigula phyllogena** (Müll. Arg.) R. C. Harris, *More Florida Lichens* : 159 (1995)
- ✦ *Porina phyllogena* Müll. Arg.
- Strigula subtilissima** (Fée) Müll. Arg., *Flora* 66: 346 (1883)
- ✦ *Racoplaca subtilissima* Fée
- Tapellaria nigrata** (Müll. Arg.) R. Sant., *Symb. Bot. Ups.* 12 (1): 499 (1952)
- ✦ *Patellaria rufula* var. *nigrata* Müll. Arg.
- Tricharia demoulinii** Sérus. in Aptroot *et al.*, *Biblioth. Lichenol.* 64: 200 (1997)
- Tricharia vainioi* R. Sant.
- Trichothelium ake-assii** Backer & Lücking in Daniels *et al.* (eds.), *Flechten Follmann*: 170 (1995)
- Trichothelium alboatrum** Vain., *Ann. Acad. Sci. Fenn., ser. A*, 15: 321 (1921)
- Trichothelium bipindense** F. Schill., *Hedwigia* 67: 278 (1927); Lücking, *Abstr. Bot.*
- Trichothelium javanicum** (F. Schill.) Vězda, *Nova Hedwigia* 58: 139 (1994)
- ✦ *Trichothelium alboatrum* var. *javanicum* F. Schill.

* ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (new records)

** ไม่ทราบชนิดใหม่ (probable new species)

c ไม่เคยมีรายงานจากการพบบนเรือนยอด (canopy lichens)



เปรียบเทียบจำนวนสกุล (genus) และชนิด (species)
ของไลเคนที่พบในโลก พบในประเทศไทยในอดีต
และพบในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปัจจุบัน

Comparison of genus and species of lichens found
at Khao Yai National Park at present with those
found during the past

family (วงศ์) genera (สกุล)	พบในโลก (จำนวน)		พบในไทย (อดีต)		พบที่เขายใหญ่ (ปัจจุบัน) (2542-2545)					
			(2452-2541)		พบทั้งหมด		พบครั้งแรก		ชนิดใหม่	
	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.
รวมทั้งหมด (32 วงศ์)	363	10086	87	659	90	518	59	236	48	129
รวม (มก- และจุลไลเคน)	319	9429	75	631	67	414	40	161	42	121
ไลเคนขนาดใหญ่ (macrolichens)										
Total 9 Families	155	5137	39	348	25	164	17	61	10	18
F. Cladoniaceae	13	435	3	45	1	11	1	6	1	2
1. Cladonia	1	402	1	43	1	11	1	6	1	2
F. Coccocarpiaceae	4	31	1	8	1	6	-	-	-	-
1. Coccocarpia	1	21	1	8	1	6	-	-	-	-
F. Collemataceae	7	346	3	35	3	18	2	5	2	5
1. Collema	1	77	1	8	1	3	-	-	1	1
2. Leptogium	1	160	1	25	1	14	1	4	1	4
3. Phyma	1	10	1	2	1	1	1	1	-	-
F. Lobariaceae	1	382	3	9	1	4	1	3	-	-
1. Sicta	1	200	1	6	1	4	1	3	-	-
F. Parmariaceae	14	115	3	3	2	5	2	3	-	-
1. Erioderma	1	25	1	1	1	2	1	1	-	-
2. Parmelinella	1	40	1	1	1	3	1	2	-	-
F. Parmeliaceae	85	2319	16	111	10	60	5	13	4	5
1. Bufothrix	1	32	1	15	1	9	1	1	-	-
2. Canoparmelia	1	33	1	7	1	1	-	-	-	-
3. Hypotrachyna	1	150	1	18	1	9	1	3	-	-
4. Myelochroa	1	19	1	6	1	1	-	-	1	1
5. Parmelinella	1	3	1	2	1	3	-	-	1	1
6. Parmelinopsis	1	18	1	4	1	3	1	1	-	-
7. Parmotrema	1	250	1	49	1	21	1	2	1	2

family (วงศ์) genera (สกุล)	พบในโลด (จำนวน)		พบในไทย (อดีต)		พบที่เขตรักษาพันธุ์ (ปัจจุบัน) (2542-2548)					
			(2452-2541)		พบทั้งหมด		พบครั้งแรก		ชนิดใหม่	
	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.
8. <i>Reflicina</i>	1	40	1	3	1	9	1	5	1	1
9. <i>Reflicinosia</i>	1	5	1	4	1	3	-	-	-	-
10. <i>Rimelia</i>	1	16	1	1	1	1	-	-	-	-
F. Physciaceae	24	858	8	62	5	39	4	23	2	4
1. <i>Dirinaria</i>	1	26	1	10	1	4	-	-	-	-
2. <i>Heterodermia</i>	1	80	1	21	1	15	1	10	1	1
3. <i>Hyporhynia</i>	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-
4. <i>Phytia</i>	1	50	1	4	1	2	1	2	-	-
5. <i>Pycnia</i>	1	45	1	17	1	17	1	10	1	3
F. Ramalinaceae	2	201	1	13	1	4	1	3	-	-
1. <i>Ramalina</i>	1	200	1	13	1	4	1	3	-	-
F. Usneaceae	5	550	1	62	1	17	1	5	1	2
1. <i>Usnea</i>	1	500	1	62	1	17	1	5	1	2
ไลเคนขนาดเล็ก (microlichens)										
18 Families	164	4292	36	283	42	250	23	100	32	103
F. Bacidiaceae	23	394	2	3	2	8	1	4	2	4
1. <i>Bacidia</i>	1	200	1	3	1	6	1	4	1	2
2. <i>Lecania</i>	1	40	1	-	1	2	-	-	1	2
F. Ectelechiaceae	11	95	-	-	1	1	-	-	1	1
1. <i>Tapellaria</i> sp. 1	1	8	-	-	1	1	-	-	1	1
F. Fusiaceae	6	37	2	3	1	4	-	-	1	4
1. <i>Maronia</i>	1	3	1	1	1	4	-	-	1	4
F. Graphidaceae	15	998	6	85	9	124	9	59	7	53
1. <i>Acanthothecia</i>	1	18	-	-	1	1	1	1	-	-
2. <i>Cyclographina</i>	1	9	-	-	1	15	1	6	1	9
3. <i>Glyphis</i>	1	30	-	-	1	1	1	1	-	-
4. <i>Graphina</i>	1	270	1	3	1	16	1	6	1	7
5. <i>Graphis</i>	1	300	1	4	1	34	1	20	1	10
6. <i>Phaeographina</i>	1	90	1	4	1	18	1	9	1	5
7. <i>Phaeographis</i>	1	200	1	1	1	31	1	10	1	20
8. <i>Sacrographa</i>	1	70	1	1	1	6	1	5	1	1
9. <i>Sacrographina</i>	1	8	-	-	1	2	1	1	1	1
F. Gyalectaceae	8	96	3	2	1	2	1	2	-	-
1. <i>Dimerella</i>	1	25	1	1	1	2	1	2	-	-
F. Haematommataceae	2	15	1	4	1	1	-	-	-	-
1. <i>Haematomma</i>	1	13	1	2	1	1	-	-	-	-
F. Hymeneliaceae	9	148	-	-	1	1	-	-	1	1
1. <i>Aspicilia</i>	1	100	-	-	1	1	-	-	1	1
F. Lecanoraceae	25	441	6	13	5	11	2	5	4	5
1. <i>Biatora</i>	1	10	-	-	1	3	1	2	1	1
2. <i>Lecanora</i>	1	300	1	11	1	4	1	3	1	1
3. <i>Maronia</i>	1	2	-	-	1	1	-	-	1	1
4. <i>Pyrenopeziza</i>	1	7	1	1	1	2	-	-	1	2
5. <i>Tephromela</i>	1	20	1	1	1	1	-	-	-	-
F. Lecideaceae	10	418	1	1	1	1	-	-	1	1
1. <i>Lecidea</i> sp. 1	1	400	1	1	1	1	-	-	1	1

family (วงศ์) genera (สกุล)	พบในภาค (จำนวน)		พบในภาค (ชนิด)		พบที่เขตรักษาพันธุ์ (ปัจจุบัน) (2542-2545)					
			(2542-2541)		พบทั้งหมด		พบครั้งเดียว		ชนิดใหม่	
	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.
F. Lecrouillaceae	1	15	1	5	1	3	1	1	1	1
1. <i>Lecrouillia</i>	1	8	1	4	1	3	1	1	1	1
F. Megalosporaceae	3	31	1	1	1	3	-	-	1	3
1. <i>Austroblastenia</i>	1	2	-	-	1	3	-	-	1	3
F. Pertusariaceae	4	294	1	5	2	2	-	-	2	2
1. <i>Ochrolechia</i> sp. 1	1	40	-	-	1	1	-	-	1	1
2. <i>Pertusaria</i> sp. 1	1	250	1	5	1	1	-	-	1	1
F. Physciaceae	2	600	2	7	2	8	2	6	1	2
1. <i>Dirinaria</i>	1	400	1	6	1	7	1	5	1	2
2. <i>Rinodina</i>	1	200	1	1	1	1	1	1	-	-
F. Pilocarpaceae	3	36	1	3	1	1	-	-	1	1
1. <i>Byssoloma</i>	1	15	1	3	1	1	-	-	1	1
F. Pyrenulaceae	16	429	1	14	1	1	-	-	1	1
1. <i>Pyrenula</i>	1	300	1	14	1	1	-	-	1	1
F. Thelotremaaceae	11	536	3	105	3	45	3	8	3	11
1. <i>Myurostroma</i>	1	150	1	27	1	9	1	1	1	5
2. <i>Ocellularia</i>	1	200	1	44	1	24	1	3	1	4
3. <i>Thelotrema</i>	1	100	1	34	1	12	1	4	1	2
F. Trapeliaceae	7	61	1	1	3	10	-	-	3	10
1. <i>Placynthiella</i>	1	4	1	1	1	8	-	-	1	8
2. <i>Trapelia</i>	1	8	-	-	1	1	-	-	1	1
3. <i>Placopsis</i>	1	34	-	-	1	1	-	-	1	1
F. Trypetheliaceae	10	248	6	38	6	24	4	15	2	3
1. <i>Astrothelium</i>	1	40	1	3	1	2	1	2	-	-
2. <i>Campylothelium</i>	1	9	1	2	1	1	-	-	-	-
3. <i>Laurera</i>	1	35	1	10	1	7	1	5	-	-
4. <i>Polysporidium</i>	1	19	1	5	1	5	1	4	1	1
5. <i>Pseudopyrenula</i>	1	45	1	1	1	1	-	-	-	-
6. <i>Trypethelium</i>	1	100	1	17	1	8	1	4	1	2
ไลเคนบนใบไม้ (foliicolous lichens)										
Total 15 Families	51	657	12	28	30	104	26	75	7	8
F. Arthoniaceae	2	30	2	2	2	5	1	4	-	-
1. <i>Arthonia</i>	1	25	1	1	1	4	1	4	-	-
2. <i>Eremothecella</i>	1	5	1	1	1	1	-	-	-	-
F. Collemataceae	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1. <i>Lepicogium</i> ^a	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
F. Ectolechiaceae	13	55	2	2	4	8	3	4	1	1
1. <i>Calopadia</i>	1	10	1	1	1	2	1	1	-	-
2. <i>Lecoloma</i>	1	6	1	1	1	2	1	1	-	-
3. <i>Sporidium</i>	1	13	-	-	1	3	1	2	1	1
4. <i>Tapellaria</i> ^b	1	12	-	-	1	1	-	-	-	-
F. Gomphillaceae	11	141	3	5	5	9	5	7	-	-
1. <i>Aulaxina</i>	1	4	-	-	1	1	1	1	-	-
2. <i>Calenia</i>	1	23	1	2	1	3	1	3	-	-
3. <i>Echinoplaca</i>	1	28	1	2	1	2	1	1	-	-
4. <i>Gyalactidium</i>	1	3	-	-	1	1	1	1	-	-
5. <i>Ticharia</i>	1	41	1	1	1	2	1	1	-	-

family (วงศ์) genera (สกุล)	พบในไลเคน (จำนวน)		พบในไลเคน (ชนิด)		พบที่เกาะใหญ่ (ปีจุลวัน) (2542-2545)					
			(2452-2541)		พบทั้งหมด		พบครั้งเดียว		ชนิดใหม่	
	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.	Ge.	Sp.
F. Graphidaceae	2	4	-	-	1	2	1	1	1	1
1. <i>Graphis</i> [*]	1	4	-	-	1	2	1	1	1	1
F. Gyalectaceae	2	37	-	-	1	5	1	4	1	1
1. <i>Conogonium</i> [*]	1	36	-	-	1	5	1	4	1	1
F. Lecanoraceae	2	16	-	-	1	1	-	-	1	1
1. <i>Bacidina</i>	1	7	-	-	1	1	-	-	1	1
F. Opegraphaceae	3	43	1	1	3	10	3	8	1	1
1. <i>Enterographa</i>	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
2. <i>Mazoria</i>	1	21	1	1	1	7	1	5	1	1
3. <i>Opegrapha</i>	1	13	-	-	1	2	1	2	-	-
F. Parmeliaceae	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1. <i>Ballothrix</i> [*]	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
F. Physciaceae	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1. <i>Dirinaria</i> [*]	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
F. Pilocarpaceae	7	131	1	3	5	18	4	14	1	1
1. <i>Budisia</i>	1	12	-	-	1	1	0	0	1	1
2. <i>Byssoloma</i> [*]	1	43	1	3	1	8	1	5	-	-
3. <i>Byssolecania</i>	1	5	-	-	1	1	1	1	-	-
4. <i>Eugelia</i>	1	7	-	-	1	1	1	1	-	-
5. <i>Peltigera</i>	1	51	-	-	1	7	1	7	-	-
F. Strigulaceae	4	46	1	4	1	7	1	4	-	-
1. <i>Strigula</i>	1	38	1	4	1	7	1	4	-	-
F. Thelothemataceae	1	9	1	2	1	3	1	2	-	-
1. <i>Chroodiscus</i>	1	9	1	2	1	3	1	2	-	-
F. Trichotheliaceae	3	142	1	9	2	32	2	23	1	2
1. <i>Porina</i>	1	109	1	9	1	28	1	19	1	2
2. <i>Trichothelium</i>	1	32	-	-	1	4	1	4	-	-
F. Monoblastidaceae	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
1. <i>Caprentia</i>	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-

หมายเหตุ

^{*} สกุล (genus) ที่มีรายงานการพบใน มหาไลเคน และจุลไลเคนด้วย (รวม 7 สกุล)

[†] มีไลเคนบนใบไม้ 9 วงศ์ ที่ซ้ำกับที่พบในมหาไลเคน และจุลไลเคน

Ge. genus

Sp. species

ไลเคนบนใบไม้ที่พบเป็นครั้งแรกมีสกุล (genus) ซ้ำกับมหาไลเคน และจุลไลเคน (macrolichens & microlichens) 7 สกุล

ไลเคนบนใบไม้ที่พบเป็นชนิดใหม่มีสกุล (genus) ซ้ำกับมหาไลเคน และจุลไลเคน (macrolichens & microlichens) 7 สกุล

จำนวนสกุล (genus) และชนิด (species) ของไลเคนที่พบในระบบนิเวศต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยแสดงถึงจำนวนชนิดที่เป็นการพบครั้งแรก (new records) และชนิดใหม่ (new species)

(Number of genus and species of lichens found in various ecosystems at Khao Yai National Park including number of species of new records and new species)

family (วงศ์)	total				LMF				DDF				DEF				TRF				MDF				SF				P			
	Sp.	Gen.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.	Gen.	Sp.	New recd.	New Sp.
รวมทั้งหมด	518	90	236	129	68	215	96	44	29	60	20	12	68	224	106	30	70	298	132	58	36	80	42	9	52	184	67	34	26	67	23	9
รวมบน และจุดไลเคน	414	67	161	121	53	173	64	43	29	60	20	12	44	151	59	27	51	236	82	54	21	50	20	8	48	177	62	34	26	67	23	9
มาไลเคน 9 วงศ์	164	25	61	18	19	77	25	4	14	28	5	2	18	71	19	3	19	92	27	7	9	18	5	—	20	75	18	4	13	36	9	1
Cladoniaceae	11	1	6	2	1	9	6	—	1	1	1	—	1	1	—	—	1	2	2	—	—	—	—	—	1	4	1	2	—	—	—	—
Coccocarpiaceae	6	1	—	—	1	4	—	—	1	5	—	—	1	6	—	—	1	6	—	—	1	1	—	—	1	5	—	—	1	1	—	—
Collemataceae	18	3	5	5	1	4	—	2	2	2	1	1	2	13	4	2	3	13	4	1	2	6	2	—	3	6	2	—	3	4	1	1
Lobariaceae	4	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parmariaceae	5	2	3	—	2	3	2	—	1	1	—	—	1	2	1	—	1	3	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Parmeliaceae	60	10	13	5	8	27	3	1	6	12	1	1	7	25	3	1	7	43	9	2	2	4	—	—	7	27	1	1	4	12	1	—
Physciaceae	39	5	23	4	3	16	10	—	3	7	2	—	3	14	6	—	3	13	4	3	4	7	3	—	5	21	10	1	3	12	6	—
Ramaliaceae	4	1	3	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	2	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	4	3	—	1	2	1	—
Usneaceae	17	1	5	2	1	12	3	1	—	—	—	—	1	6	1	—	1	8	2	1	—	—	—	—	1	7	1	—	1	5	—	—
จุดไลเคน 18 วงศ์	250	42	100	103	34	96	39	39	15	32	15	10	26	80	40	24	32	144	55	47	12	32	15	8	28	102	44	30	13	31	14	8
Bacidaceae	8	2	4	4	2	4	1	3	—	—	—	—	2	3	1	2	2	2	1	1	1	3	3	—	1	4	3	1	—	—	—	—
Ecotrichaceae	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fusidiaceae	4	1	—	4	1	3	—	3	1	2	—	2	1	2	—	2	1	2	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—
Graphidaceae	124	9	59	53	8	33	17	12	4	14	9	2	9	50	29	13	8	73	41	22	4	14	8	1	8	64	33	17	8	25	13	6
Gyalactaceae	2	1	2	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	2	2	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Haematommataceae	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Hymeneliaceae	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	1	—	—	—
Lecanoraceae	11	5	5	5	5	8	4	3	3	4	1	3	5	5	2	2	4	5	2	2	1	1	1	—	4	5	1	3	—	—	—	—
Lecideaceae	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
Letrotriciaceae	3	1	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	3	1	1	1	2	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—
Megalosporaceae	3	1	—	3	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pertusariaceae	2	2	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Physciaceae	8	2	6	2	2	3	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	2	3	3	—	—	—	—	—
Pilocarpaceae	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pyrenulaceae	1	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Thelotremaaceae	45	3	8	11	2	14	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	3	36	6	6	—	—	—	—	3	7	—	1	—	—	—	—
Trapeliaceae	10	3	—	10	2	6	—	6	1	2	—	2	1	4	—	4	1	5	—	5	1	6	—	6	2	5	—	5	1	1	—	1
Trypetheliaceae	24	6	15	3	6	17	10	1	2	5	2	—	4	10	5	—	4	9	2	2	2	4	1	—	4	8	3	—	3	4	1	—
ไลเคนบนใบไม้ 15 วงศ์	104	30	75	8	15	42	32	1	—	—	—	—	24	73	47	3	19	62	50	4	15	30	22	1	4	7	5	—	—	—	—	—

Sp. = species, Gen. = genus, New recd. = new records, New sp. = new species.

LMF = ป่าดิบเขา (lower montane forest), DDF = ป่าดิบเตี้ย (dry dipterocarp forest), DEF = ป่าดิบแล้ง (dry evergreen forest), TRF = ป่าดิบชื้น (tropical rain forest), MDF = ป่าเบญจพรรณ (mixed deciduous forest), SF = ป่าดิบเขา (secondary forest), P = พืชบนใบไม้ (plantation)

Not for sale : If you have purchased or witnessed purchasing of this document, kindly inform such activity to
Biological Resources Section
Office of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning
60/1 Soi Phibul Wattana 7, Rama VI Road,
Bangkok 10400 THAILAND
Telephone (66) 2279-7186-9, 2271-4232 ext. 186, 286

ห้ามซื้อขาย : หากท่านได้ซื้อ หรือพบเห็นการซื้อขายเอกสารฉบับนี้ โปรดแจ้ง
ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2279-7186-9, 0-2271-4232 ต่อ 186, 286